

تعليمات الاستعمال:				
الموعد الأخير للرش قبل القطف	المقادير سم³ / دونم	الافة	المحصول	
٣ أيام	٥٠	بياض دقيقى	بطبخ، خيار، شمام، كوسا، فرع. (بالحفل المكشوف والدفيئيات)	
١٢ أيام	٥٠	بياض دقيقى	فلفل. (بالحفل المكشوف والدفيئيات)	
٣ أيام	٧٥	بياض دقيقى	بندورة (بالحفل المكشوف والدفيئيات)	
٣ أيام	٥٠	بياض دقيقى	جزر	
٣٠ يوم	٥٠	سبتوريما، صدأ الأوراق	فمح	
٣٠ يوم	٥٠	بياض دقيقى	عبد الشمس	
٣٠ يوم	٥٠	بياض دقيقى	برسيم، بيكيما، فصه	
١١ يوم	% ٠٠١	بياض دقيقى	عنبر	
١٤ يوم	% ٠٠٢	بياض دقيقى	تفاح	
١١ يوم	% ٠٠٣	بياض دقيقى	مانجا، خوخ	

**مبيد فطري عصاري لمكافحة البياض الدقيقي في محاصيل الخضروات،
كروم العنبر، التفاح وغيرها...
عام:**

مستحضر عصاري تابع لجموعة كيماوية تعمل لتعطيل الأرغوستول. يستوعب
المبيد عن طريق الأوراق وينتشر في جميع أجزاء النبتة إلى القمم النامية.
يجب تهيئة الفيئات ثناء الرش.

يجب الاهتمام بالرش الكامل لجميع أجزاء النبتة بالمستحضر والبدء بالرش عند

ظهور الاصابة. والعودة للمعالجة خلال ٧ - ١٤ يوم حسب درجة الاصابة.

وسائل الحذر:

يجب استعماله بموجب قواعد الحذر المتبعة عند استعمال المبيدات. استعمل لباس كامل
لكل الجسم. قفازات، كماما، نظارات واقية ثناء الرش. واحذر من استنشاق وابتلاع
المستحضر ومن ملامسته المباشرة لأعضاء الجسم. منع الأكل الشرب والتدخين ثناء
الاستعمال.

تأثيرات سلبية: المستحضر سام للسمك وللثديات المائية.

تحضير محلول الرش:

تخلط الكمية المطلوبة من المستحضر مع الماء وتسكب داخل وعاء المرش المملوء
حتى ثلثة بالماء وتضاف كمية الماء المتبقية مع الحفاظ على الخلط المتواصل وفي كل
الاحوال عند خلط مادة اخرى يجب اضافتها في الثالث الثاني لكمية الماء في وعاء
المرش.

أوپן היישום: לנער היטב לפני השימוש

גידול הנגע	טיפול אחורי לפני קטיב'	נפח תוסיס מינון	ריסוס עד נגירה	קייחון התפוח
תפוח מנגו, אפרסק	21 ימים	0.02%	ריסוס עד נגירה	קייחון המנגה קייחון האפרסק
גפן	21 ימים	0.01%	ריסוס עד נגירה	קייחון הגפן
אבטיה, גזר, מלפפון, קישוא, מלון, דלעת (בשדה גלי וחוסי)*	3 ימים			קייחון הדלועיים
פלפל (בשדה גלי וחוסי)*	12 ימים	50 סמ"ק/ד'	ריסוס בונפה בינוי עד 100 ל'ך	קייחונית חמנית
חמנית אספסת, בקיה קלתן	30 ימים			קייחון קטניות קייחון
עגבניה (בשדה גלי וחוסי)*	3 ימים	75 סמ"ק/ד'		קייחונית עגבניה
חיטה	30 ימים	50 סמ"ק/ד'	ספטוריה עלי הילדון	ספטוריה עלי הילדון

*יש לאוורור את החממה בעת הריסוס.

יש לדאוג לכיסוי מלא של הצמחים המרוסטים בתכשיר. יש להתחיל בריסוס
עם הופעת הנגע ולחזור על הטיפולים מיד 14-7 ימים, בהתאם לעוצמת הנגע.
שילובים: בגפן (זנים: קרייניאן, SBS) ניתן לשלבו עם התכשירים: מובנו 100 תר..

יש להשתמש בתואריית המשולבת על פי הוראות השימוש שבתוויות
התכשיר המשולב.
בハウדר מידע נוסף לשלב התכשיר זה עם תכשירים אחרים.

כלי: תכשיר השיך לקבוצת מעכבי ארגוסטROL. התכשיר
סיסטמי ונקלט דרך העלים ומשם מועבר לחלקו הצמח הצעירים.