



MOVENTO[®] 100 SC

موبنتو[®] موفينتو

كيفية الاستعمال:

المحصول	الآفة	الجرعة (سم ² للدونم، أو %)	حجم الرش (لتر للدونم)	الموعد الأخير للرش قبل القطف (أيام)	ملاحظات
رمان	حشره عث الرمان	0.09	150-100	70	موعد الرش: في بدايه ظهور الحشره واكتساء الشجره بالاوراق
الإجاص	بسيلا الإجاص	0.09	180 – 200	7	يجب الرش عندما تنكسي الأشجار كامل أوراقها. الرش عندما تبيض الحشرات الطور الصفي الأول. في حال أن الطور الأول يبدأ بالتفقيس قبل اكتساء كامل أوراق الشجرة يجب استعمال مادة غير الموفنتو. في حال اندماج الأطوار يجب الاستشارة بالمرشد. يجب رش المادة ليس قبل 10 أيام من علاج CCC في البستان.
تفاح	من السبيريya المن القطني	0.09	130-180	14	معالجه واحده في الموسم
بصل	تربس التبغ	35	40 – 20	14	الرش الأول بدءاً من سن 3 – 4 ورقات، الرش مرة إضافية (بحسب الحاجة) بعد فترة زمنية لا تقل عن 14 يوماً
أفوكادو	الحشرة القشرية الحمراء	0.09%	100-120	45	عدسة مكبرة 10* ومساحة السطح 2.25 سنتمتر
حمضيات	الحشرة القشرية الحمراء عنكبوت الصدا	0.09%	400 – 200	14	موعد رش الموقظ لمكافحة عنكبوت الصدا عند رؤية أقل من عنكبوتين لمساحة عدسة مكبرة
كرمة (عنب)	بق العنب الدقيقي	0.09%	100-120	7	في قطع الأرض التي لها تاريخ في الإصابة يُنصح بالاستعمال في نهاية الإزهار. لا يجوز الرش أكثر من مرتين في الموسم. موعد رش المادة لمكافحة الحشرة القشرية الحمراء. موعد رش الموقظ لمكافحة الحشرة القشرية الحمراء في بداية الربيع، في فترة وضع البيض.
دلوريث، يقطين	الذبابة البيضاء	50	60 – 30	3	



MOVENTO[®] 100 SC

موبنتو[®] موفينتو

المحصول	الآفة	الجرعة (سم ² للدونم، أو %)	حجم الرش (لتر للدونم)	الموعد الأخير للرش قبل القطف (أيام)	ملاحظات
ملفوف، بروكلي، قرنبيط	حشرة عث التبغ	50	40 – 20	3	
بطيخ	حشرة عث التبغ	50	40 – 20	3	
شمام	حشرة عث التبغ	50	40 – 20	3	
كوسا	حشرة عث التبغ	50	60 – 30	3	
بادنجان	حشرة عث التبغ	50	50 – 30	3	
الخس	حشره عث التبغ	50	40 - 20	7	
فاصولياء	حشره عث التبغ	50	30 - 15	7	
فلفل حلو، بندورة	حشرة عث التبغ	50	100 – 20	3	
التوابل: ربحان، ثوم معمر، جرجير، روكولا، بصل أخضر، نعنع، مريمية، زعتر، إكليل الجبل، طرخون، كزبرة، ثبث، بقونس، كرفس الزهور*.	حشرة عث التبغ	50	50 – 20	7	موعد استعمال المستحضر مع ظهور الآفة في الحقل. الرش مرة إضافية (بحسب الحاجة) بعد فترة زمنية لا تقل عن 14 يوماً. لا يجوز الرش أكثر من مرتين في الموسم.
ليزيانثوس، زهرة الجرس، جريبيرا، عصا الذهب، هليون	حشرة عث التبغ	50	100 – 200	-	المادة تعالج فقط اليرقات، يجب الرش عند وصول اوراق الجزر الى 51 سنتمتر ومع ظهور بيوض البسيلا
جزر	بسيلا الجزر	100	40 - 20	30	

في الحمضيات (الأنواع): سان رايز، أورا، نوقا، نيو هول، أشكوليت حمراء، فلسيا، واشنطن، بطوري و تويار) يمكن دمجه مع المستحضر دورسان
*إصناف الزهور التي تم فحصها: ليزيانثوس – mc-1، ريزيتا أبيض، ميراج أبيض، لونا روز (وردي)، مورت مارين (أزرق أبيض)، زهرة الجرس – أزرق، الجريبيرا – أولتيم، إيفامريا، أوبرتي، عصا الذهب، - جولدن غلوري، الهليون – دوبيوم. بسبب كثرة الأصناف المتنوعة من الزهور والواردة أعلاه ليست لدينا إمكانية لفحص سلامة المستحضر على جميع أصناف النباتات. قبل تجريب المستحضر على الأصناف المختلفة، ينبغي التجريب في البداية على عدد محدود من النباتات. الخطر: في حالة عدم وجود معلومات أخرى يمنع خلط الموقظ مع مستحضر آخر.



MOVENTO[®] 100 SC

موبنتو[®] موفينتو

عند انتهاء الاستعمال: تنظيف المرش: في نهاية الرش يجب إفراغ الوعاء من البقايا حسب تعليمات التخلص من مياه الشطف. ومن ثم شطف المرش وجميع أجزائه بالماء والمادة المنظفة. يجب التخلص من مياه الشطف حسب تعليمات التخلص من مياه الشطف.
تخليص من مياه الشطف: ممنوع تفريغ شطف المستحضرات أو البقايا من جهاز المرش، من وعاء التجميع أو من أي وعاء آخر إلى الحقول، برك الأسماك أو أي مصادر وتجمعات مياه على اختلاف أنواعها. يجب التخلص من مياه الشطف بطرق مصادق عليها على يد وزارة حماية البيئة، مثل: الرش في حقل زراعي، استعمال متكرر، تطهير، تبخير وإخلاء لموقع النفايات السامة في رמת حوفان.
الحماية الشخصية عند انتهاء العمل: في حال التماس، يجب غسل المكان جيداً بالماء والصابون. عند الانتهاء من العلاج، يجب غسل الجسم جيداً وخصوصاً الأعضاء التي كانت مكشوفة أثناء الرش وتبديل الملابس. يجب غسل ملابس العمل على أفراد وتنظيف معدات الوقاية بواسطة مادة تنظيف.
الدخول من جديد للحقل واللبיות البلاستيكية: عند جفاف المحلول مسموح الدخول للحقل من جديد.
التخزين: يجب تخزين المستحضر في مخزن مغلق والمخصص لتخزين مواد مكافحة الحشرات، بعيداً عن متناول أيدي الأولاد والأشخاص الغير مؤهلين. يجب إعادة المادة الزائدة إلى المخزن فور الانتهاء من عملية الرش وعدم تركها في الحقل.

مستحضر مسكوب: يجب سكب الرمل أو نشارة الخشب على المستحضر المسكوب، وجمعه ونقله إلى موقع النفايات السامة.
إعادة العبوات الفارغة: يجب شطف العبوات الفارغة ثلاث مرات وإضافة مياه الشطف للمادة الموجودة في خزان الرش. بعد ذلك إلّاؤها في حاوية القمامة.
إسعافات أولية: في حالة الاشتباه بحدوث تسمم، أخرج المصاب إلى الهواء الطلق واجعله يستلقي في مكان مظلل ومهوى واحرص على الحصول على مساعدة فورية من قبل طبيب مع إحضار ملصقة المبيد. في حالة البلع يجب إخلاء المصاب إلى الطبيب. في حالة تلوث العينين، يجب شطفهما في ماء نظيف جاري لمدة ١٥ دقيقة والتوجه إلى الطبيب. في حالة تلوث الجلد، قم بغسل المكان المصاب بالماء والصابون.
معلومات للطبيب: المركز القطري للمعلومات عن التسمم، مستشفى ريماء، هاتف رقم: ٠٤-٧٧٧١٩٠٠.

بترخيص من قسم وقاية النبات رقم: ٢٠١١/و.ن/٤٠٧٢
ليس للاستعمال المنزلي للاستعمال الزراعي فقط
دفعه إنتاج: _____
حلتنة الملصقة: _____
Manuf. Date: "See on pack"
Expiry Date: 3 YEARS FROM PRO. DATE
Batch No: "See on pack"

ليدور للكيماويات م.ض
شارع هنتفيم، ص.ب. ١١٦
رמת هشارون ٤٧١٠٠
هاتف: ٠٣-٧٦٠٦٢٢٢
نحن مسؤولون عن ملاءمة هذا المستحضر للتطبيق الكيميائي لرقعة المستحضر وملاءمته للأهداف المصرح بها على ظهر الرقعة. فقط عندما يتم استعمال المستحضر حسب التعليمات. في ظروف استعمال عادية. مسؤوليتنا. المذكورة أعلاه. لا تسري في حالات استعمال المستحضر بشكل يخالف التعليمات المدونة في الرقعة أو في ظروف استعمال غير عادية أو بظروف غير متوقعة لدينا. في حالات مثل هذه، تسري المسؤولية بكاملها على مشتري المستحضر وعلى من يستعمله فقط. كل مسؤولية أخرى مباشرة أو غير مباشرة. لا تسري علينا.

إنتاج: Bayer AG
المنتج: Bayer AG



مكيل: 100 گرم لليتير Spirotetramat
هيتير: حومري ديلول وهرטה
كللي: موبنتو هينو تكشير مكبوضه كيميت حدهه (حومضوت سترميت) وبعل منگون فعوله حديش هغورم لعيكب سينتت حومضوت هشون هدروشوت ليصيرت ممبروت هتاهم بگوف همزيك. هتكشير سيسممي دو كيونو وموعبر لكل خلقي هضمه آليهه يش ذريمته مومسمم (هن بعظه هن بشيفه). لآهر قلئت هتكشير عيي هدرغوت هصعيرت سل مزيكم موصم لمينيهه. كحلتن لعبرو لدرغوت متقدموت يوتر نفعته (أورج زمن هتموته تليو بدرت همزيك /أو تناي هسببه). لتهكشير گم هشفعه عل نكבות بוגروت عيي فגיעه بيحلت لهسيل بيضم.

عند انتهاء الاستعمال: تنظيف المرش: في نهاية الرش يجب إفراغ الوعاء من البقايا حسب تعليمات التخلص من مياه الشطف. ومن ثم شطف المرش وجميع أجزائه بالماء والمادة المنظفة. يجب التخلص من مياه الشطف حسب تعليمات التخلص من مياه الشطف.
تخليص من مياه الشطف: ممنوع تفريغ شطف المستحضرات أو البقايا من جهاز المرش، من وعاء التجميع أو من أي وعاء آخر إلى الحقول، برك الأسماك أو أي مصادر وتجمعات مياه على اختلاف أنواعها. يجب التخلص من مياه الشطف بطرق مصادق عليها على يد وزارة حماية البيئة، مثل: الرش في حقل زراعي، استعمال متكرر، تطهير، تبخير وإخلاء لموقع النفايات السامة في رמת حوفان.
الحماية الشخصية عند انتهاء العمل: في حال التماس، يجب غسل المكان جيداً بالماء والصابون. عند الانتهاء من العلاج، يجب غسل الجسم جيداً وخصوصاً الأعضاء التي كانت مكشوفة أثناء الرش وتبديل الملابس. يجب غسل ملابس العمل على أفراد وتنظيف معدات الوقاية بواسطة مادة تنظيف.
الدخول من جديد للحقل واللبיות البلاستيكية: عند جفاف المحلول مسموح الدخول للحقل من جديد.
التخزين: يجب تخزين المستحضر في مخزن مغلق والمخصص لتخزين مواد مكافحة الحشرات، بعيداً عن متناول أيدي الأولاد والأشخاص الغير مؤهلين. يجب إعادة المادة الزائدة إلى المخزن فور الانتهاء من عملية الرش وعدم تركها في الحقل.

مكيل: 100 گرم لليتير Spirotetramat
هيتير: حومري ديلول وهرטה
كللي: موبنتو هينو تكشير مكبوضه كيميت حدهه (حومضوت سترميت) وبعل منگون فعوله حديش هغورم لعيكب سينتت حومضوت هشون هدروشوت ليصيرت ممبروت هتاهم بگوف همزيك. هتكشير سيسممي دو كيونو وموعبر لكل خلقي هضمه آليهه يش ذريمته مومسمم (هن بعظه هن بشيفه). لآهر قلئت هتكشير عيي هدرغوت هصعيرت سل مزيكم موصم لمينيهه. كحلتن لعبرو لدرغوت متقدموت يوتر نفعته (أورج زمن هتموته تليو بدرت همزيك /أو تناي هسببه). لتهكشير گم هشفعه عل نكבות بוגروت عيي فגיעه بيحلت لهسيل بيضم.

عند انتهاء الاستعمال: تنظيف المرش: في نهاية الرش يجب إفراغ الوعاء من البقايا حسب تعليمات التخلص من مياه الشطف. ومن ثم شطف المرش وجميع أجزائه بالماء والمادة المنظفة. يجب التخلص من مياه الشطف حسب تعليمات التخلص من مياه الشطف.
تخليص من مياه الشطف: ممنوع تفريغ شطف المستحضرات أو البقايا من جهاز المرش، من وعاء التجميع أو من أي وعاء آخر إلى الحقول، برك الأسماك أو أي مصادر وتجمعات مياه على اختلاف أنواعها. يجب التخلص من مياه الشطف بطرق مصادق عليها على يد وزارة حماية البيئة، مثل: الرش في حقل زراعي، استعمال متكرر، تطهير، تبخير وإخلاء لموقع النفايات السامة في رמת حوفان.
الحماية الشخصية عند انتهاء العمل: في حال التماس، يجب غسل المكان جيداً بالماء والصابون. عند الانتهاء من العلاج، يجب غسل الجسم جيداً وخصوصاً الأعضاء التي كانت مكشوفة أثناء الرش وتبديل الملابس. يجب غسل ملابس العمل على أفراد وتنظيف معدات الوقاية بواسطة مادة تنظيف.
الدخول من جديد للحقل واللبיות البلاستيكية: عند جفاف المحلول مسموح الدخول للحقل من جديد.
التخزين: يجب تخزين المستحضر في مخزن مغلق والمخصص لتخزين مواد مكافحة الحشرات، بعيداً عن متناول أيدي الأولاد والأشخاص الغير مؤهلين. يجب إعادة المادة الزائدة إلى المخزن فور الانتهاء من عملية الرش وعدم تركها في الحقل.

مكيل: 100 گرم لليتير Spirotetramat
هيتير: حومري ديلول وهرטה
كللي: موبنتو هينو تكشير مكبوضه كيميت حدهه (حومضوت سترميت) وبعل منگون فعوله حديش هغورم لعيكب سينتت حومضوت هشون هدروشوت ليصيرت ممبروت هتاهم بگوف همزيك. هتكشير سيسممي دو كيونو وموعبر لكل خلقي هضمه آليهه يش ذريمته مومسمم (هن بعظه هن بشيفه). لآهر قلئت هتكشير عيي هدرغوت هصعيرت سل مزيكم موصم لمينيهه. كحلتن لعبرو لدرغوت متقدموت يوتر نفعته (أورج زمن هتموته تليو بدرت همزيك /أو تناي هسببه). لتهكشير گم هشفعه عل نكבות بוגروت عيي فגיעه بيحلت لهسيل بيضم.

إنتاج: Bayer AG
المنتج: Bayer AG



MOVENTO[®] 100 SC

موبنتو[®] موفينتو

1 لتر

1 L net

2xSYS

تريخ رحيق
كوسل حركيم لفرسم، أبوكو، غف، تپوف، آگم، ريمون، يركوت، تبلينم وپرحيم

مكيل: 100 گرم لليتير Spirotetramat
هيتير: حومري ديلول وهرטה
كللي: موبنتو هينو تكشير مكبوضه كيميت حدهه (حومضوت سترميت) وبعل منگون فعوله حديش هغورم لعيكب سينتت حومضوت هشون هدروشوت ليصيرت ممبروت هتاهم بگوف همزيك. هتكشير سيسممي دو كيونو وموعبر لكل خلقي هضمه آليهه يش ذريمته مومسمم (هن بعظه هن بشيفه). لآهر قلئت هتكشير عيي هدرغوت هصعيرت سل مزيكم موصم لمينيهه. كحلتن لعبرو لدرغوت متقدموت يوتر نفعته (أورج زمن هتموته تليو بدرت همزيك /أو تناي هسببه). لتهكشير گم هشفعه عل نكבות بוגروت عيي فגיעه بيحلت لهسيل بيضم.

مكيل: 100 گرم لليتير Spirotetramat
هيتير: حومري ديلول وهرטה
كللي: موبنتو هينو تكشير مكبوضه كيميت حدهه (حومضوت سترميت) وبعل منگون فعوله حديش هغورم لعيكب سينتت حومضوت هشون هدروشوت ليصيرت ممبروت هتاهم بگوف همزيك. هتكشير سيسممي دو كيونو وموعبر لكل خلقي هضمه آليهه يش ذريمته مومسمم (هن بعظه هن بشيفه). لآهر قلئت هتكشير عيي هدرغوت هصعيرت سل مزيكم موصم لمينيهه. كحلتن لعبرو لدرغوت متقدموت يوتر نفعته (أورج زمن هتموته تليو بدرت همزيك /أو تناي هسببه). لتهكشير گم هشفعه عل نكבות بוגروت عيي فגיעه بيحلت لهسيل بيضم.

مكيل: 100 گرم لليتير Spirotetramat
هيتير: حومري ديلول وهرטה
كللي: موبنتو هينو تكشير مكبوضه كيميت حدهه (حومضوت سترميت) وبعل منگون فعوله حديش هغورم لعيكب سينتت حومضوت هشون هدروشوت ليصيرت ممبروت هتاهم بگوف همزيك. هتكشير سيسممي دو كيونو وموعبر لكل خلقي هضمه آليهه يش ذريمته مومسمم (هن بعظه هن بشيفه). لآهر قلئت هتكشير عيي هدرغوت هصعيرت سل مزيكم موصم لمينيهه. كحلتن لعبرو لدرغوت متقدموت يوتر نفعته (أورج زمن هتموته تليو بدرت همزيك /أو تناي هسببه). لتهكشير گم هشفعه عل نكבות بוגروت عيي فגיעه بيحلت لهسيل بيضم.

إنتاج: Bayer AG
المنتج: Bayer AG



הגידול	הפגע	מינון (סמ"ק לדונם, או %)	נפח תרסיס (ליטר לדונם)	מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות
רימון	כנימות עלה, כנימת עש הרימון	0.09%	100-150	70	יש לרסס על נפח עלווה מלא. מועד יישום התכשיר עם התחלת הנגיעות בשטח.
אגס	פסילת האגס	0.09%	180-200 בהתאם לגודל העץ	7	- יש לרסס על נפח עלווה מלא. - יישום התכשיר עם הטלת דור קיצי ראשון. - במידה ודור קיצי ראשון מתחיל לבקוע לפני נוף מספק יש להשתמש בחומר אחר לפני השימוש במובנט. - במקרה של ערוב דורות יש להתייעץ עם מדריך. - יש ליישם את התכשיר לא פחות מ-10 ימים לאחר טיפול CCG במטע.
בצל	תריפס הטבק	35	20-40	14	ריסוס ראשון החל מגיל 3-4 עלים, ריסוס נוסף (בהתאם לצורך) במרווח של לא פחות מ 14 ימים
הדרים	כנימה אדומה, אקרית חלודה	0.09%	200-400	14	מועד יישום מובטח כנגד אקרית חלודה בנגיעות נמוכה מ-2 אקריות מממוצע לשדה זכוכית מגדלת מועד יישום התכשיר כנגד הכנימה האדומה באביב המוקדם עם תחילת ההשראה
תפוח	כנימת עלה הספיראה צמרית התפוח (כנימת דם)	0.09%	130-180	14	יישום בודד בעונה
גפן	משפחת הקמחייתיים (כנימה קמחית של הגפן)	0.09% מעל נפח תרסיס של 100 ליטר 90 סמ"ק לדונם בנפח תרסיס מתחת ל- 100 ליטר	100-120	7	- בחלקות עם היסטוריה של נגיעות מומלץ ליישם בתוב פריחה. - מועד יישום התכשיר עם תחילת הנגיעות בגזע טרם עלייתה לנוף הפגנים. - אין ליישם לפני דילול שריגים. - אין לרסס יותר מפעמיים בעונה.
אבוקדו	כנימה אדומה	0.09%	100-120	45	מועד יישום התכשיר כנגד הכנימה האדומה באביב המוקדם עם תחילת ההשראה
תבלינים: זיל, עירית, רוקט, רוקולה, בצל ירוק, מנטה, מרווה, קורנית, יוזמין, טרגון, כוסברה, שמיר, פטרוזיליה, כרפס עלים	כנימת עש הטבק, כנימת עלה הדלועיים	50	20-50	7	מועד יישום התכשיר עם הופעת המזיק בשטח



הגידול	הפגע	מיון (סמ"ק לזונם, או %)	נפח תריסס (ליטר לדונם)	מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות
גזר	פסילת הגזר	100	20-40	30	התכשיר מדביר אך ורק את שלב הנימפות. יש ליישם בשלב בו אורך העלווה לפחות 15 ס"מ ועם הופעת ביצי הפסילה.
כרוב, ברוקולי, כרובית, קולורבי	כנימת עש הטבק	50	20-40	3	- בגידול הנזרע בתחילת העונה, טרם הופעת המזיק בשדה יש ליישם את התכשיר עם הופעת נגיעות בשטח. - בשתילות חדשות בשיא עונת פעילות המזיק יש ליישם כשבועיים משתילה (מועד בקיעת ביצי המזיק). - ריסוס נוסף (בהתאם לצורך) במרווח של לא פחות מ- 14 ימים. - אין לרסס יותר מפעמיים בעונה.
אבטיח					
מלון					
קישוא					
חציל					
עגבנייה					
דלורית, דלעת					
חסה					
שעועית					
פלפל					
כנימת עש הטבק	50	20-100	3	שני ריסוסים במרווח של לא פחות משבוע בין הריסוסים.	
תריפס קליפורני	50	20-100	3	- מועד יישום התכשיר עם הופעת המזיק בשטח. - ריסוס נוסף (בהתאם לצורך) - במרווח של לא פחות מ- 14 ימים. - אין לרסס יותר מפעמיים בעונה.	
פרחים? לזיאנטוס, טרליום, גרברה, סולידג, נץ חלב	כנימת עש הטבק	100-120	עד לנגירה	-	

100


