



MOVENTO[®] 100 SC
מובנטו[®] מופינטו

1 L net

1 ליטר

2XSYS

תרכיז רחף

קוטל חרקים לפרדס, אבוקדו, גפן, אגס,
 רימון, ירקות, תבלינים ופרחים

מכיל: 100 גרם לליטר Spirotetramat
 היתר חומרי דילול והרטבה

זכא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק לפיה

רעילות IV (מסוכן) מספר אירוע 3082

ברשיון האגף להגנת הצומח מס': 4072/הצ/2011

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד

للإستعمال الزراعي فقط وليس للإستعمال البيتي

Bayer



IL84994537G



מכיל: 100 גרם לליטר Spirotetramat
היתר חומרי דילול והרטבה

כללי: מובנטו הינו תכשיר מקבוצה כימית חדשה (חומצות טטרמיות) ובעל מנגנון פעולה חדיש הגורם לעיכוב סינתזת חומצות השומן הדרושות ליצירת ממברנות התאים בגוף המזיק. התכשיר סיסטמי דו כיווני ומועבר לכל חלקי הצמח אליהם יש זרימת מומסים (הן בעצה והן בשיפה). לאחר קליטת התכשיר ע"י הדרגות הצעירות של מזיקים מוצצים למיניהם, יכולתן לעבור לדרגות מתקדמות יותר נפגעת (אורך זמן התמותה תלוי בדרגת המזיק ו/או תנאי הסביבה). לתכשיר גם השפעה על נקבות בוגרות ע"י פגיעה ביכולת להטיל ביצים.

מובנטו פועל להדברת מזיק המטרה בעיקר כרעל קיבה. לאחר חדירת החומר לרקמת הצמח מתרחשת טרנספורמציה כימית אשר בעקבותיה החומר הופך רעיל למזיקי מטרה. לכן, יעילות ביולוגית מלאה תלויה ביכולת החדירה של החומר הפעיל לתוך רקמות העלים והעברתו לכל חלקי הצמח דרך מערכות ההובלה. חדירה וסיסטמיות ועל כן יעילות, עלולים להיות מופחתים כשיישום התכשיר מתבצע במהלך תקופה בה הצמח סובל מעקות פיזיולוגיות (כדוגמת קור או יובש) או במהלך תקופה בה הצמח לא מתפתח/גדל באופן פעיל. מסיבה זו, הפעילות המיטבית של התכשיר מובנטו מושגת ביישום על עלווה ירוקה צומחת ועל ענפים צעירים. כמו כן, כיסוי הצד התחתון של העלים ביטיח חדירה והובלה של החומר הפעיל בצמח באופן מיטבי. התכשיר נחשב ככך לגבי אויבים טבעיים ולכן יכול לשמש ככלי חשוב במערכת של הדברה משולבת. התכשיר אינו רעיל לדבורים בוגרות ואינו נחשב כמסוכן לוולדותיהן בתנאי שדה רגילים.

הוראות שימוש:

אזהרות: מסוכן בבליעה. עלול לגרום לריגוש בעור. לא מומלץ לנשים בגיל הפוריות. פוגע בפוריות, עלול לפגוע בעובר.

אמצעי זהירות: יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים בעת השימוש בתכשיר בהתאם לכללי זהירות בחומרי הדברה: בעת הטיפול יש להימנע מבליעה, נשימת הרחף ומגע ישיר של החומר עם איברי הגוף ובגדים. בעת טיפול עם החומר המרוכז יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער. יש להשתמש בעבודה עם תכשיר ההדברה בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3). בעת הטיפול בתכשיר יש להשתמש במסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P ומשקפי מגן (תקן EN-166). בעת הטיפול בתכשיר המרוכז יש לחבוש גם מסיכת נשימה. אין לשתות, לאכול או לעשן בזמן הטיפול.

סכנות לסביבה: מזיק ליצורים השוכנים בסביבה מימית, עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים. הכנת התרסיס: מלא את מיכל הריסוס בחלקו במים, שפוך את הכמות הדרושה של התכשיר לתוך רשת הסיון שבפתח המיכל, הפעל את המערבל ושטוף את התכשיר לתוך המיכל בעת הוספת יתרת המים.

Manuf. Date : "See on pack"
 Expiry Date : 3 YEARS FROM PRO. DATE
 Batch No : "See on pack"

עידכון R 01/2022

Bayer



MOVENTO[®] 100 SC

מובנטו[®] מופינטו

אופן היישום: חובה לדאוג לכיסוי עלווה מירבי

הגידול	הפגע	מינון (סמ"ק לדונם, או %)	נפח תרסיס (ליטר לדונם)	מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות
רימון	כנימות עלה, כנימת עש הרימון	0.09%	100-150	70	יש לרסס על נפח עלווה מלא. מועד יישום התכשיר עם התחלת הנגיעות בשטח.
אגס	פסילת האגס	0.09%	180-200 בהתאם לגודל העץ	7	- יש לרסס על נפח עלווה מלא. - יישום התכשיר עם הטלת דור קיצי ראשון. - במידה ודור קיצי ראשון מתחיל לבקוע לפני נוף מספק, יש להשתמש בחומר אחר לפני השימוש במובנטו. - במקרה של ערוב דורות יש להתייעץ עם מדריך. - יש ליישם את התכשיר לא פחות מ-10 ימים לאחר טיפול CCC במטע.
בצל	תריפס הטבק	35	20-40	14	ריסוס ראשון החל מגיל 3-4 עלים, ריסוס נוסף (בהתאם לצורך) במרווח של לא פחות מ 14 ימים
הדרים	כנימה אדומה, אקרית חלודה	0.09%	200-400	14	מועד יישום מובנטו כנגד אקרית חלודה בנגיעות נמוכה מ-2 אקריות בממוצע לשדה זכוכית מגדלת. מועד יישום התכשיר כנגד הכנימה האדומה באביב המוקדם עם תחילת ההשרצה
גפן	משפחת הקמחיתיים (כנימה קמחית של הגפן)	0.09% מעל נפח תרסיס של 100 ליטר 90 סמ"ק לדונם בנפח תרסיס מתחת ל- 100 ליטר	100-120	7	- בחלקות עם היסטוריה של נגיעות מומלץ ליישם בתום פריחה. - מועד יישום התכשיר עם תחילת הנגיעות בגזע טרם עלייתת לנוף הגפנים. - אין ליישם לפני דילול שריגים. - אין לרסס יותר מפעמיים בעונה.
אבוקדו	כנימה אדומה	0.09%	100-200	45	מועד יישום התכשיר כנגד הכנימה האדומה באביב המוקדם עם תחילת ההשרצה
תבלינים: בזיל, עירית, רוקט, רוקולה, בצל ירוק, מנטה, מרווה, קורנית, רוזמרין, טרגון, כוסברה, שמיר, פטרוזיליה, כרפס עלים	כנימת עש הטבק, תריפס הטבק, כנימת עלה הדלועיים	50	20-50	7	מועד יישום התכשיר עם הופעת המזיק בשטח

הערה: (1) זכוכית בעלת הגדלה של פי 10 ושטח ראייה של 2.25 סמ"ר.

שילובים:
בבצל (זנים): מיקדו, אדום ואורלנדו 686 ניתן לשלב עם התכשיר מסורול 500 ת.ר.. נתיבו 75% ג.ר.. מיתוס 300 ת.ר..
בהדרים (זנים): סן רייז, אורה, נובה, ניו הול, אשכולית אדומה, ולנסיה, וושינגטון, טבורי וסופז) ניתן לשלב עם התכשיר דורסן. זנים – פומלו, אשכולית לבנה, אשכולית אדומה, לימון, אור, אורה, פומלית, טופז, וולנסיה, ניתן לשלב עם התכשיר שמן JMS.
בגפן (זנים): רד גלוב, סופריוור, קריניאן, SBS) ניתן לשלב עם התכשיר: נתיבו 75% ג.ר. (זנים: קריניאן, SBS) ניתן לשלב עם התכשירים: פוליקור 250 ת.מ. ובאפידן 250 ת.מ.. יש להשתמש בתוארית המשולבת על פי הוראות השימוש שבתווית התכשיר המשולב.
 השילובים נבדקו רק בון שציון, יש לבחון את השילוב בזנים אחרים לפני ריסוס מסחרי.
 בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים.
 המשך טבלת אופן היישום בעמוד הבא.



MOVENTO[®] 100 SC

מובנטו[®] מופינטו

המשך אופן היישום: חובה לדאוג לכיסוי עלווה מירבי.

הגידול	הפגע	מינון (סמ"ק לדונם, או %)	נפח תרסיס (ליטר לדונם)	מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות
גזר	פסילת הגזר	100	20-40	30	התכשיר מדביר אך ורק את שלב הנימפות. יש ליישם בשלב בו אורך העלווה לפחות 15 ס"מ ועם הופעת ביצי הפסילה.
כרוב, ברוקולי, כרובית, קולורבי	כנימת עש הטבק	50	20-40	3	- בגידול הנזרע בתחילת העונה, טרם הופעת המזיק בשדה יש ליישם את התכשיר עם הופעת נגיעות בשטח. - בשתילות חדשות בשיא עונת פעילות המזיק יש ליישם כשבועיים משתילה (מועד בקיעת ביצי המזיק). - ריסוס נוסף (בהתאם לצורך) במרווח של לא פחות מ- 14 ימים. - אין לרסס יותר מפעמיים בעונה.
אבטיח			20-40		
מלון			20-40		
קישוא			30-60		
חציל			30-50		
עגבנייה			20-100		
דלורית, דלעת			30-60		
חסה			20-40	7	
שעועית			15-30	7	
פלפל	כנימת עש הטבק	50	20-100	3	
פריחים ² , ליזיאנטוס, טרכליום, גרברה, סולידגו, נץ חלב	כנימת עש הטבק	50	100-200	-	- מועד יישום התכשיר עם הופעת המזיק בשטח. - ריסוס נוסף (בהתאם לצורך) במרווח של לא פחות מ- 14 ימים. - אין לרסס יותר מפעמיים בעונה.
שני ריסוסים במרווח של לא פחות משבוע בין הריסוסים. מדביר דרגות צעירות בלבד.				3	

הערה: (2)

זני פרחים שנבדקו: ליזיאנטוס - mc-1 לבן, רוזיטה לבן, מיראז' לבן, לונה רוז (ורוד), מורט מרין (כחול לבן), טרכליום - כחול, גרברה - אולטימה, אווה-מריה, אופרטי, סולידגו - גולדן גלורי, נץ החלב - דוביים. בשל מגוון הזנים הרב של הפרחים הנ"ל אין לנו אפשרות לבדוק בטיחות התכשיר לכל זני צמחים. אם טרם התנסית בתכשיר בזנים השונים, יש לנסות תחילה על מספר מצומצם של צמחים.

שילובים:

בחציל (זנים): קלאסיק, מרגריטה, (1726) ניתן לשלב עם התכשיר טלדור 500 ת.ש.

בעגבנייה (זנים): טרה קוטה, שרי תמר, ניקוס, ברונז ומוזה) ניתן לשלב עם התכשיר: ביסקיה 240 ת.ש.מ.

כרוב (זנים: פרוקטור) ניתן לשלב עם התכשירים: ביסקיה 240 ת.ש.מ, מאצ'ו 50 ת.ש.

באבטיח (זנים: 616) ניתן לשלב עם התכשיר נתיבו 75 גר. (זנים: מללי, מקסימה) ניתן לשלב עם התכשיר ביסקיה 240 ת.ש.מ.

במלון (זנים): גלורי, מירון, גלנטי, יוניב) ניתן לשלב עם התכשיר ביסקיה 240 ת.ש.מ.

בקישוא (זנים: קוריסט, טופזין, שורוק) ניתן לשלב עם התכשיר: שמן קליצו JMS (זנים: קוריסט וטופזין) ניתן לשלב עם התכשיר: ביסקיה 240 ת.ש.מ,

יש להשתמש בתוארית המשולבת על פי הוראות השימוש שבתווית התכשיר המשולב.

השילובים נבדקו רק בזן שצוין, יש לבחון את השילוב בזנים אחרים לפני ריסוס מסחרי.

בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים.



MOVENTO[®] 100 SC

מובנטו[®] מوفينتو

אופן היישום:

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאירות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: במקרה של מגע יש לרחוץ היטב את המקום עם מים וסבון. עם גמר הטיפול, יש לרחוץ היטב את הגוף בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

כניסה מחדש לשדה: עם התייבשות התרסיס מותר להיכנס מחדש לשטח.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריות ויקות: את האריות והריקות לשטוף 3 פעמים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס במיכל המרסס. אח"כ השלך אותן לפח אשפה.

עזרה ראשונה: במקרה של חשד להרעלה, הוצא את הנפגע לאוויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא, והצג בפניו תווית זו. במקרה של בליעה יש לפנות הנפגע לרופא. במקרה של זיהום בעיניים, יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, ב"ח רמב"ם טלפון מס': 04-7771900

תנאי מכירה:

אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו.

MOVENTO[®] 100 SC

موفينتو[®]

موفينتو

رقم الأمم المتحدة: غير

مبيد حشري جهاززي

درجة السُمية: IV (خطر)

مصنف

مبيد حشرات لبستان البصل

والعنب والإجاص والخضار

والتوابل والزهور

يحتوي: ١٠٠ غرام للتر

Spirotetramat

الباقى مواد إذابة وترطيب

اقرأ الملصقة يتمتعن قيل

الاستعمال

عام: موفينتو هو مستحضر من مجموعة كيميائية جديدة (تابع للأحماض النيترونيكية) ذو آلية عمل حديثة يتسبب في تعطيل التركيب الكيميائي للحامض الدهني المطلوب لإنتاج أغشية الخلايا في جسم الآفة. المستحضر عصاري كامل ويتحرك بالاتجاهين وينقل إلى جميع أجزاء النبتة التي تتدفق إليها المواد المذابة عن طريق الاوعية الخشبية واللحاء. بعد امتصاص السم عن طريق صغار الآفات الماصة على اختلاف أنواعها فإنها لا تتمكن من الانتقال إلى أطوار ودرجات أكثر تقدماً وبالتالي وفي نطاق زمني من ٢ إلى ٥ أيام تموت الآفة (إطالة مدة الموت يعتمد على درجة الآفة و/أو ظروف البيئة). للمستحضر تأثير على الإناث البالغات أيضاً بواسطة الإخلال في قدرتها على وضع البيض. يعتبر المستحضر ودياً بالنسبة للأعداء الطبيعية ولذلك يمكن استخدامه كمبيد هام في برنامج مكافحة المتكاملة. المستحضر غير سام للنحل البالغ ولا يعتبر خطراً ليرقات النحل في ظروف استعمال ورش مناسبة. يعمل موفينتو على إبادة الآفة الهدف في الأساس كسم للمعدة. بعد دخول المادة إلى نسج النبتة تحدث عملية تحوّل كيميائية تتحوّل المادة في أعقابها إلى مادة سامة للأفات الهدف. لذلك، إن النجاعة البيولوجية الكاملة مرتبطة بفترة تغلغل المادة الناشطة إلى داخل أنسجة الأوراق ونقلها إلى كلّ أجزاء النبتة عبر منظومات النقل. إنّ التغلغل والمنهجية وكذلك النجاعة من الممكن أن تكون مخففة عندما يتم تطبيق استخدام المستحضر خلال فترة تعاني فيها النبتة من معيقات فسيولوجية (مثل البرد أو الجفاف) أو خلال فترة لا تتطور/تنمو فيها النبتة بشكل ناشط. لهذا السبب، إنّ النشاط الأقصى للمستحضر موفينتو يتحقق من خلال تطبيقه على أوراق خضراء نامية وعلى فروع صغيرة جداً. كذلك، فإنّ غطاء الجانب السفليّ للأوراق يضمن تغلغل ونقل المادة الناشطة في النبتة بصورة قصوى.

تحذيرات: قد يؤدي إلى تهيج الجلد. لا يوصى للنساء في فترة الخصوبة، ممكن أن يضر بالإخصاب، وإلحاق ضرر بالجنين.

وسائل الحذر:

يجب اتخاذ جميع وسائل الحذر المتبعة عند استعمال المستحضر وفقاً لقواعد الحذر مع المبيدات: عند الاستعمال يجب الامتناع عن بلع، استنشاق المعلق والتماس المباشر للمادة مع أعضاء الجسم والملابس. يجب ارتداء ملابس واقية وقفازات مطاطية مقاومة للمواد الكيميائية عند التعامل مع المستحضر المركز، ممنوع الشرب، تناول الطعام أو التدخين أثناء استعمال المستحضر. يجب لباس ملابس طويلة خصوصية وحذاء واقية وطقيه.

مخاطر بيئية: سام للكائنات التي تعيش في الماء – قد يسبب ظواهر سلبية طويلة الأمد للبيئة المائية.

تحضير مادة الرش: املاً وعاء المرش حتى نصفه بالماء، اسكب كمية المستحضر المطلوبة إلى داخل شبكة التصفية التي في فتحة المرش، شغل الخلاط واشطف المستحضر لداخل وعاء المرش أثناء إضافة باقي كمية الماء المطلوبة.

MOVENTO[®] 100 SC

موبنتو[®] موفينتو

كيفية الاستعمال:

المحصول	الآفة	الجرعة (سم للدونم، أو %)	حجم الرش (لتر للدونم)	الموعد الأخير للرش قبل القطف (أيام)	ملاحظات
رمان	حشره عث الرمان	0.09	150-100	70	موعد الرش: في بدايه ظهور الحشره وإكتساء الشجره بالاوراق
الإجاص	بسيلا الإجاص	0.09	200 – 180 حسب كبر الشجرة	7	يجب الرش عندما تكتسي الأشجار كامل أوراقها. الرش عندما تبيض الحشرات الطور الصيفي الأول. في حال أن الطور الأول يبدأ بالتنقيس قبل اكتماء كامل أوراق الشجرة يجب استعمال مادة غير الموقتة. في حال اندماج الأطوار يجب الاستشارة بالمرشد. يجب رش المادة ليس قبل 10 أيام من علاج CCC في البستان.
بصل	تربس التبغ	35	40 – 20	14	الرش الأول بدءاً من سن 3 – 4 ورقات، الرش مرة إضافية (بحسب الحاجة) بعد فترة زمنية لا تقل عن 14 يوماً
أفوكادو	الحشرة القشرية الحمراء	0.09%	100-120	45	عدسة مكبرة *10 ومساحة السطح 2.25 سنتيمتر
حمضيات	الحشرة القشرية الحمراء عنكبوت الصدا	0.09%	400 – 200	14	موعد رش الموقتة لمكافحة عنكبوت الصدا عند رؤية أقل من عنكبوتين لمساحة عدسة مكبرة
كرمة (عنب)	بق العنب الدقيقي	0.09% أكثر من حجم 100 لتر من المستحضر أو 90 سم مكعب للدونم بحجم مستحضر يقل عن 100 لتر	100-120	7	في قطع الأرض التي لها تاريخ في الإصابة يُنصح بالاستعمال في نهاية الإزهار. لا يجوز الرش أكثر من مرتين في الموسم. موعد رش المادة لمكافحة الحشرة القشرية الحمراء. موعد رش الموقتة لمكافحة الحشرة القشرية الحمراء في بداية الربيع، في فترة وضع البيوض.
دلوريت، يقطين	الذبابة البيضاء	50	60 – 30	3	

MOVENTO[®] 100 SC

موبنتو[®] موفينتو

المحصول	الآفة	الجرعة (سم للدونم، أو %)	حجم الرش (لتر للدونم)	الموعد الأخير للرش قبل القطف (أيام)	ملاحظات
ملفوف، بروكلي، قرنبيط	حشرة عث التبغ	50	40 – 20	3	في المحاصيل التي زرعت في بداية الموسم، قبل ظهور الآفة في الحقل يجب استعمال المستحضر مع ظهور الإصابات في الموقع. في الشتلات الجديدة في ذروة موسم نشاط الآفة يجب استعماله قبل الزرع بأسبوعين (موعد تقفيس بيض الآفة). الرش مرة إضافية (بحسب الحاجة) بعد فترة زمنية لا تقل عن 14 يومًا. لا يجوز الرش أكثر من مرتين في الموسم.
بطيخ	حشرة عث التبغ	50	40 – 20	3	
شمّام	حشرة عث التبغ	50	40 – 20	3	
كوسا	حشرة عث التبغ	50	60 – 30	3	
بادنجان	حشرة عث التبغ	50	50 – 30	3	
الخس	حشره عث التبغ	50	40 - 20	7	
فاصولياء	حشره عث التبغ	50	30 - 15	7	
فلفل حلو، بندورة	حشرة عث التبغ	50	100 – 20	3	
التوابل: ريحان، ثوم معمر، جرجير، روكولا، بصل أخضر، نعنع، مريمية، زعتر، إكليل الجبل، طرخون، كزبرة، شبت، بقونس، كرفس	حشرة عث التبغ تربس حشرة من القطن	50	50 – 20	7	موعد استعمال المستحضر مع ظهور الآفة في الحقل.
الزهور*: ليزيانتوس، زهرة الجرس، جريبرا، عصا الذهب، هليون	حشرة عث التبغ	50	100 – 200	-	موعد استعمال المستحضر مع ظهور الآفة في الحقل. الرش مرة إضافية (بحسب الحاجة) بعد فترة زمنية لا تقل عن 14 يومًا. لا يجوز الرش أكثر من مرتين في الموسم.
جزر	بسيلا الجزر	100	40 - 20	30	المادة تعالج فقط البرقات، يجب الرش عند وصول أوراق الجزر الى 51 سنتمتر ومع ظهور بيوض البسيلا

في الحمضيات (الأنواع: سان رايز، أورا، نواف، نيو هول، أشكوليت حمراء، فلنسيا، واشنطن، طيوري وتوباز) يمكن دمجه مع المستحضر دورسان
*أصناف الزهور التي تم فحصها: ليزيانثوس – mc-1 أبيض، روزيتا أبيض، ميراج أبيض، لونا روز (وردي)، مورت مارين (أزرق أبيض)، زهرة الجرس – أزرق، الجريبرا – أولتيميا، إيفامريا، أوبرتي، عصا الذهب، - جولدن غلوري، الهليون -
دوبيوم. بسبب كثرة الأصناف المتنوعة من الزهور والوردة أعلاه ليست لدينا إمكانية لفحص سلامة المستحضر على جميع أصناف النباتات. قبل تجريب المستحضر على الأصناف المختلفة، ينبغي التجريب في البداية على عدد محدود من النباتات.
الخطأ: في حالة عدم وجود معلومات أخرى يمنع خلط الموفنطو مع مستحضر آخر.



MOVENTO[®] 100 SC

موبنتو[®] موفينتو

عند انتهاء الاستعمال:

تنظيف المرش: في نهاية الرش يجب إفراغ الوعاء من البقايا حسب تعليمات التخلص من مياه الشطف. ومن ثم شطف المرش وجميع أجزائه بالماء والمادة المنظفة. يجب التخلص من مياه الشطف حسب تعليمات التخلص من مياه الشطف.

التخلص من مياه الشطف: ممنوع تفريغ وشطف المستحضرات أو البقايا من جهاز المرش، من وعاء التجميع أو من أي وعاء آخر إلى الحقول، برك الأسماك وأي مصادر وتجمعات مياه على اختلاف أنواعها. يجب التخلص من مياه الشطف بطرق مصادق عليها على يد وزارة حماية البيئة، مثل: الرش في حقل زراعي، استعمال متكرر، تطهير، تبخير وإخلاء لموقع النفايات السامة في رمات حوثاق.

الحماية الشخصية عند انتهاء العمل: في حال التماس، يجب غسل المكان جيدًا بالماء والصابون. عند الانتهاء من العلاج، يجب غسل الجسم جيدًا وخصوصًا الأعضاء التي كانت مكشوفة أثناء الرش وتبديل الملابس. يجب غسل ملابس العمل على انفراد وتنظيف معدات الوقاية بواسطة مادة تنظيف.

الدخول من جديد للحقل: عند جفاف المحلول مسموح الدخول للحقل من جديد.

التخزين: يجب تخزين المستحضر في مخزن مغلق والمخصص لتخزين مواد مكافحة الحشرات، وبعيدًا عن متناول أيدي الأولاد والأشخاص الغير مؤهلين. يجب إعادة المادة الزائدة إلى المخزن فور الانتهاء من عملية الرش وعدم تركها في الحقل.

مستحضر مسكوب: يجب سكب الرمل أو نشارة الخشب على المستحضر المسكوب، وجمعه ونقله إلى موقع النفايات السامة.

إعادة العبوات الفارغة: يجب شطف العبوات الفارغة ثلاث مرات وإضافة مياه الشطف للمادة الموجودة في خزان الرش. بعد ذلك إلّاؤها في حاوية القمامة.

إسعافات أولية: في حالة الاشتباه بحدوث تسمم، أخرج المصاب إلى الهواء الطلق واجعله يستلقي في مكان مظلل ومهوى واحرص على الحصول على مساعدة فورية من قبل طبيب مع إحضار ملصقة المبيد. في حالة **البلع** يجب إخلاء المصاب إلى الطبيب. في حالة تلوث **العينين**، يجب شطفهما في ماء نظيف جاري لمدة ١٥ دقيقة والتوجه إلى الطبيب. في حالة تلوث **الجلد**، قم بغسل المكان المصاب بالماء والصابون.

معلومات للطبيب: المركز القطري للمعلومات عن التسمم، مستشفى رمبام، هاتف رقم: ٠٤-٧٧٧١٩٠٠.



MOVENTO[®] 100 SC

موبنتو[®] موڤينتو

بترخيص من قسم وقاية النبات رقم : ٢٠١١/و،ن/٤٠٧٢

ليس للاستعمال المنزلي للاستعمال الزراعي فقط

المنتج: Bayer AG

ليدور للكيماويات م.ض
شارع هثثيثيم، ص.ب. ١١٦
رمات هشارون ٤٧١٠٠
هاتف: ٠٣-٧٦٠٦٢٢٢

إنتاج: Bayer AG

حتلنة الملصقة:

Manuf. Date : "See on pack"
Expiry Date : 3 YEARS FROM PRO. DATE
Batch No : "See on pack"

دفعه إنتاج: _____

شروط البيع :

نحن مسؤولون عن ملاءمة هذا المستحضر للتركيبه الكيماويه لرقعة المستحضر وملاءمته للأهداف المصرح بها على ظهر الرقعة. فقط عندما يتم استعمال المستحضر حسب التعليمات. في ظروف استعمال عادية. مسؤوليتنا. المذكورة أعلاه. لا تسري في حالات استعمال المستحضر بشكل يخالف التعليمات المدونة في الرقعة أو في ظروف استعمال غير عادية أو بظروف غير متوقعة لدينا. في حالات مثل هذه. تسري المسؤولية بكاملها على مشتري المستحضر وعلى من يستعمله فقط. كل مسؤولية أخرى مباشرة أو غير مباشرة. لا تسري علينا.



MOVENTO[®] 100 SC
מובנטו[®] מופינטו

1 L net

1 ליטר

2XSYS

תרכיז רחף

קוטל חרקים לפרדס, אבוקדו, גפן, אגס,
 רימון, ירקות, תבלינים ופרחים

מכיל: 100 גרם לליטר Spirotetramat
 היתר חומרי דילול והרטבה

קרא בעיון את התוויות לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק לפיה

רעילות IV (מסוכן) מספר אימי: 3082

ברשיון האגף להגנת הצומח מס': 4072/הצ/2011

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד

للإستعمال الزراعي فقط وليس للإستعمال البيتي

Bayer



מכיל: 100 גרם לליטר Spirotetramat
 היתר חומרי דילול והרטבה

מכיל: 1 ליטר

כללי: מובנטו הינו תכשיר מקבוצה כימית חדשה (חומצות סטרמייות) ובעל מנגנון פעולה חדש הגורם לעיכוב סינתזת חומצות השומן הדרושות ליצירת ממברנות התאים בגוף המזיק. התכשיר סיסטמי ודיו כיווני ומעבר לכל חלקי הצמח אליהם יש זרימת מומסים (הן בעצה והן בשיפה). לאחר קליטת התכשיר ע"י הדרגות הצעירות של מזיקים מוצצים למיניהם, יכולתן לעבור לדרגות מתקדמות יותר נפגעת (אורך זמן התמותה תלוי בדרגת המזיק ו/או תנאי הסביבה). לתכשיר גם השפעה על נקבות בוגרות ע"י פגיעה ביכולת להטיל ביצים. מובנטו פועל להדברת מזיק המטרה בעיקר כרעל קיבה. לאחר חדירת החומר לרקמת הצמח מתרחשת טרנספורמציה כימית אשר בעקבותיה החומר הופך רעיל למזיקי מטרה. לכן, יעילות ביולוגית מלאה תלויה ביכולת החדירה של החומר הפעיל לתוך רקמות העלים והעברתו לכל חלקי הצמח דרך מערכות ההובלה. חדירה וסיסטמיות ועל כן יעילות, עלולים להיות מופחתים כשישום התכשיר מתבצע במהלך תקופה בה הצמח סובל מעקות פיזיולוגיות (כדוגמת קור או יובש) או במהלך תקופה בה הצמח לא מתפתח/גדל באופן פעיל. מסיבה זו, הפעילות המיטבית של התכשיר מובנטו מושגת ביישום על עלווה ירוקה צומחת ועל ענפים צעירים. כמו כן, כיסוי הצד התחתון של העלים יבטיח חדירה והובלה של החומר הפעיל לצמח באופן מיידי. התכשיר נחשב כרך לגבי איבים טבעיים ולכן יכול לשמש ככלי חשוב במערכת של הדברה משולבת. התכשיר אינו רעיל לדבורים בוגרות ואינו נחשב כמסוכן ללולדותיהן בתנאי שדה רגילים.

הוראות שימוש:

אזהרות: מסוכן בבליעה. עלול לגרום לריגוש בעור. לא מומלץ לנשים בגיל הפוריות. פוגע בפוריות, עלול לפגוע בעובר.

אמצעי זהירות: יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים בעת השימוש בתכשיר בהתאם לכללי זהירות בחומרי הדברה: בעת הטיפול יש להימנע מבליעה, נשימת הרחף ומגע ישיר של החומר עם איברי הגוף ובגדים. בעת טיפול עם החומר המרוכז יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער. יש להשתמש בעבודה עם תכשיר ההדברה בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3). בעת הטיפול בתכשיר יש להשתמש במסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P ומשקפי מגן (תקן EN-166). בעת הטיפול בתכשיר המרוכז יש לחבוש גם מסיכת נשימה. אין לשתות, לאכול או לעשן בזמן הטיפול.

סכנות לסביבה: מזיק ליצורים השוכנים בסביבה מימית, עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.

הכנת התרסיס: מלא את מיכל הריסוס בחלקו במים, שפוך את הכמות הדרושה של התכשיר לתוך רשת הסיון שבפתח המיכל, הפעל את המערבל ושטוף את התכשיר לתוך המיכל בעת הוספת יתרת המים

Manuf. Date : "See on pack"
 Expiry Date : 3 YEARS FROM PRO. DATE
 Batch No : "See on pack"

תאריך: 01/2022 R

Bayer