

בעליהם, במיוחד לא עם ילדים. על אנשים עם רגישות  
ידועה למרכבי הקולר להימנע מגע אתו.

#### ażhorot labeli chaim:

רעיל לדברים. אין לטפל בגורים בני פחות מ 7 שבועות. אין להשתמש במקרה של רגשות לחומרים הפעילים או למי מהחומרים הבaltı פעילים. מחקרים מעבדה, בחולדות וארנבות, עם אimidاكלופריד אן פלומטרין, לא השיעו על פוריות או רבייה ולא הראו כל תופעות של פגעה בהרין או בעובר, למורות זאתן מכיוון שהשפעת המוצר על חיוט המטרה לא נבדקה בהרין והנקה ובהעדר נתונים, הקולר לא מומלץ לשימוש בכלבות הרות ומיניקות.  
- מפת טבעו של הקולר, מקרה של מין יתיר אינו סביר ולא צפויים סימנים של מין יתיר. מין יתיר של 5 קולרים סביר הצואר נבדק: בכלבים בגורים למשך 8 חודשים ובగורים בני 7 שבועות למשך 6 חודשים. לא צפו תופעות שליליות מלבד איבוד שיער קל ותגובה עורית קלה. במקרה בלתי סביר של בליעת הקולר ע"ז בעל החיים, ניתן לצפות לתופעות קלות של מערכת העיכול (כגון צואה רכה).

#### תופעות לוואי:


בימים הראשונים לאחר עמידת הקולר עלולים להופיע לעיתים גרד קל ו/או אדמוניות בע בעלי חיים שלא רגילים לענוד קולר, ודאו שהקולר לא מהודק מדי. איבוד שיער קל ותגובה עורית קלה עלולים להופיע באזורי הקולר, התופעות חולפות בד"כ כעבור שבוע עד שבועיים ללא צורך בהסרת הקולר. במקרים בוודאים ניתן להמליץ על הסרת הקולר עד להיעלמות התסמים.

במקרים נדירים מאוד, עלולה להופיע תגובה מקומית באזורי הקולר כגון דלקת בעור, אגזהה, או פצע. במקרים כאלה מומלץ להסיר את הקולר. במקרים נדירים, סימנים נירולוגיים כגון חוסר יציבות (ataxia) עוויתות (convulsions) ורעד עלולים להופיע. במקרים כאלה מומלץ להסיר את הקולר כמו כן, עלולה להופיע בהתאם לתגובה קלה וחולפת כגון דיכאון, שינויים בצריכת המזון, הזלת ריר, הקאה ושלשול.

במידה ו מבחנים בסימנים ממשמעותם כלשהם, או בסימנים שלא מצוינים בעلون זה יש להודיע לווטרינה.

#### הוראות שימוש והთווויות נגד:

אין להשתמש לאחר תאריך התטוגה המוטבע על גבי האריזה.  
קולר אחד לבעל חיים, לענייה מסביב לצואරו לשימוש על העור, לשימוש חיצוני בלבד.  
יש להוציא את הקולר, מהשקיית המגינה עליון, בסמוך בזמן השימוש. למתוח את הקולר ולוודא שלא נשארו חיבורו פלסטיק בחלק הפנימי שלו. יש לענוד את הקולר מסביב לצואר בעל החיים מבלי להדק אותו מדי (יש לוודא שניתן להכניס 2 אצבעות בין הקולר לבין הצואר). יש להעביר את הקצה דרך הלולאה לגוזור את העודף כרך שיישאר קצר באורך של לא יותר מ 2 ס"מ.



## **סרסטו**

**kolr ledaberat kraczot, pruoshim vekinim  
voldchit kraczot (monu hizmdot)  
laklevim bemeskal meul 8 kg belbad**

\*עמיד למים \*חסר ריח

לשימוש וטרינרי בלבד  
לשימוש חיצוני בלבד

#### הרכב:

kolr achd baoruk 70 cm (meskal 45 gr) mclil:  
חומרם פעילים:

4.5 gr' amidakloprid (Imidacloprid)  
2.03 gr' flumethrin (Flumethrin)

#### התווויות:

להדברת **pruoshim**, (Ctenocephalides felis), ולמניעת הדבקה חזורת, במשך 7 עד 8 חודשים. הייעולות נגד פרעושים מתחילה מיד עם עמידת הקולר. בגין על הסביבה הקרובה של בעל החיים מההתפתחות זחלי פרעושים במשך עד 8 חודשים.

סרסטו יכול לשמש כחלק ממכלול הטיפול נגד אלרגיה לפרעושים (FAD).

לקולר פועלות רציפה מתמשכת של קטילת **kraczot** Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, (Dremacentor reticulatus (מניעת היצמדות) של kraczot של Rhipicephalus sanguineus (Rh) למשך עד 8 חודשים. הקולר יעיל נגד הארכוות והנימפות (שלבי ההתפתחות הצעירים של הkraczot) ונגד הkraczot הבוגרות.

יתכן שkraczot שנמצאות על הכלב לפני תחילת הטיפול לא יموתו תוך 48 שעות מעמידת הקולר ושיארו צמודות ונראות לעין, لكن מומלץ להסיר kraczot שנמצאות על הכלב בזמן עמידת הקולר. מניעת ההדבקה בkraczot חדשות מתחילה תוך יומיים מעמידת הקולר.

טיפול נגד הדבקה בכינים נושכות (Trichodectes canis)

יש לענוד את הקולר לפני תחילת עונת הפרעושים והkraczot.

#### ażhorot l'mashتمש:

כמו עם כל מוצר וטרינרי, אל תאפשרו לילדים לשחק עם הקולר, או לשים אותו בפיים. אין לאפשר בע בעלי חיים העונדים את הקולר לישון באותו מיטה עם

למים או לרחצה, שכן זה עלול לkker את מושך פועלות הקולר. מחקרים מראים, כי לאחר שהחומר הפעיל התפזר בפורה, ח피יה בשמפו או טבילה במים, פעם בחודש, לא מקצרת באופן משמעותי את 8 חודשים הייעילות של הקולר נגד קרציות, אולם הייעילות נגד פרעושים מתקצרת בהדרוגה, החל מהחודש החמישי שני החומרים הפעילים משחררים לאט ובאופן רציף מהקולר אל עורו של בעל החיים. שני החומרים מצויים על פרוות בעל החיים, בריכוזים שקטולים את הקרציות והפרעושים במשך כל תקופת הפעילות של הקולר. החומרים מתפזרים מהקולר על פני כל שטח עורו של בעל החיים.

פעילות נגד פרעושים מתחילה מיד עם עמידת הקולר. יעילות הקולר הוכחה גם נגד פרעושים מסווגים שניים מתקבלים: *Pullex* iritanse – *Ctenocephalides canis*.

המווצר דוחה קרציות لكن מצמצם באופן עיקף את ההדבקה במחלות שמועברות על ידן. נמצא שהקולר יעיל גם נגד קרציות מסווגים הבאים: *Ixodes hexagonus*, *I. scapularis*, *Dermacentor variabilis* ו- *I. holocyclus*.

קולרים שיפרו את מצבם של כלבים נגעים בסוגי *Sarcoptes scabiei* והביאו להחלמה מלאה תוך 3 חודשים.

#### תנאי מכירה:

אנו אחרים לזה שמווצר זה תואם את המפרט הימי של תוויית האריזה ומתאים למטרות המוצחרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים.

אחריתנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצוואר הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידינו. במקרים כאלו האחיזות חלה במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה אינה חלה علينا.

יצרן: Bayer Animal Health GmbH, גרמניה.  
יבוא ושיווק: לידור אלמנטים בע"מ, רח' הנביים,  
ת.ד. 116, רמת השרון 4710002, טל' 03-7606222.

ברישון השירותים הווטרינרים מס' 1303. בתוקף עד  
لتאריך 31.07.2024

אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה. השירותים הווטרינרים קובעים כי השימוש בתכשיר, שלא עפ"י הוראות התווית עלול לפגוע במשתמש, בעלי חיים, מסוכן לבリアות הציבור והסביבה ומהוועה עבירה על החוק!

וש לעוד את הקולר ברכזיות במשך 8 חודשים ההגנה ולהסירו בתום תקופת הטיפול. יש לבדוק מפעם לפעם ולהתאים את הקולר במידת הצורך, במיוחד במקרה של גורם הגדים במהירות.

#### אמצעי בטיחות ומיגון:

יש לשטוף ידיים, במים קרירים, לאחר עמידת הקולר. אין לאכול לשות או לעשן בזמן עמידת הקולר. יש לשמר את השקית עם הקולר בתוך הקפסה החיצונית עד לרגע השימוש. יש להשליך לאשפה באופן מיידי כל שריר או קצוות גורם של הקולר.

#### סיכון לסביבה:

התכשיר רעיל ליוצרים החיים במים, עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית. רUIL לדבורים.



#### אחסון:

יש לאחסן את התכשיר באזיזתו המקורי במקום מוצל, נעל, מיועד לאחסן תכשירים כימיים, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

יש לאחסן הרחק ממזון, שתיה, או מזון לבע"ח. אין להוציא את הקולר מהאריזה המקורי עד לרגע השימוש.

#### טיפול באזיזות ריקות:

קולרים לא משומשים או חלקיים, אריזות ריקות, או קולרים משומשים בתום תקופת השימוש, יש לעטוף בשקית פלסטיק אטומה ולהשליך את השקית לאשפה הביתה.

אין להשליך קולרים או אריזות ריקות למקורות מים.

#### עזרה ראשונה ומידע לרופא:

במקרה של מגע התכשיר בעור יש לרוץ את המקום היטב במים וסבון. אם חדר בטעות חומר לעיניים, יש לשטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות. במקרה של בליעת התכשיר, או אם הגירוי בעור או בעיניים נמשך – יש לפנות לטיפול רפואי, בצווף רפואי או במרכז הרפואי על הרעלות, ביה"ח רמב"ם, טל': 04-7771900.

#### מידע נוספת:

כלל, קרציות יפלו מהכלב כעבור 24 עד 48 שעות מרגע שעלו עליו, יימתו, מבלי שמצוודם.

לא ניתן למנוע באופן מוחלט הצמדות של קרציות בודדות, لكن לא ניתן למנוע לחלוטן העברת מחלות על ידי קרציות, במידה והתנאים קשים.

כמו עם כל מוצר ארוך טווח, נשירת שיער עונתית מסיבית, עלולה להביא לירידה קלה וחולפת ביעילות המוצר, עקב נשירה של חלק מהחומר הפעיל היחיד עם השיער. השלמת החומר הפעיל ע"י הקולר מתרחשת באופן מיידי, כך שייעילות מלאה מושגת ללא צורך בתיפול נוסף או החלפה של הקולר.

לשיטה אופטימלית בעית פרעושים בסביבה נגעה מאוד יש לטפל בסביבה המחייבת בחומר מותאים.

הקולר עמיד למים, הוא נושא וילג גם אם בעל החיים נרטב. יחד עם זאת, יש להימנע מחשיפה ממושכת

