



1 ליטר

תכשיר להדברת כימסון בתפוא"א, כשותית במלפפון,
מלון ובצל ומקמקת (פיתיום) במלפפון.

Fenamidone 75 g/l. Propamocarb 375 g/l

היתר חומרי דילול והרטבה

סיווג: IV (מסוכן) **תصنيف - IV خطر**

מס או"ם: 3082 **رقم: UN 3082**

קיראו בעיון את התווית לפני השימוש והקפידו על היישום אך ורק על פיה

אִפְרָא הַלַּסְקָה בְּתִמְעֵן קִבֵּל הַאִסְתֵּמַל וְתִאָדָּק מִן הַתְּطִיבִיק חֲסִיבָהּ חֲפֻט.

לשימוש חקלאי בלבד – לא לשימוש ביתי

للإستعمال الزراعي فقط وليس للإستعمال البيتي

רשיון האגף להגנת הצומח: 05/הצ/1792
תְּרִיחִיבִיס חֲסִיבִיס הַחֲדִמַת לְרִוּקֵיבַת הַנִּיבַת רִקֵּם 05 / ו.נ. / 1792

Gowan
CROP PROTECTION LIMITED

Saraswati Agro-Chemicals
גרמניה וצרפת ו-Bayer מיוצר ע"י
GOWAN אנגליה עובר Chemicals

לידור אלמנטס בע"מ,
רמת השרון 4710002.
טל: 03-7606222

Lidorr Elements

עדכון תווית: 03.2023

כללי:

התכשיר יעיל להדברת מחלות. יש להקפיד על כיסוי מושלם של כל חלקי הנוף.

לתכשיר 2 מרכיבים - הסיסטמי, פרופמוקארב, מדביר את מחוללי מחלות כימסון וכשותית גם לאחר שחדרו לצמח. המרכיב השני, פנמידון, הינו חומר פרוטקטנט וטרנסלמינרי המדביר את מחוללי המחלות: כשותית, כמשון, חלפת ופתיום לפני חדירתם לצמח, אך אינו פוגע בהם לאחר מכן. שילוב של שני המרכיבים נותן הדברה מלאה של מחוללי המחלות. קונסנטו מיועד לריסוס מניעה או כטיפול תגובה מיד עם הופעת הכתמים הראשונים של מחלות כימסון או כשותית.

הוראות השימוש:

אזהרות: מסוכן בבליעה. החומר גורם לגירוי בעיניים.

אמצעי זהירות ומיגון:

יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להקפיד על בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער. להשתמש בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3) ומשקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166). יש להקפיד על שימוש במסכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3. יש להימנע מבליעת התכשיר ושיאפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים.

אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

סכנות לסביבה:

התכשיר רעיל מאוד ליצורים שוכני מים עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה מימית. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

רעיל לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.

הכנת התרסיס:

ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים. מפעילים את המערבל ושמים את כמות הקונסנטו הדרושה. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול.

החמיה השחשית: ענד נהייה העלג, יתוגב גשל הגסג גיבד וعلו גיה התחיד הגזג העי קאנת מכשופה אנתש הרש ותגיייר המלגס. יתוגב גשל מלגס העמל פי הגסלה עלו חדה ותתגיי המעדט הווקיה במדה מנתפה.

הדחול מגדדו הגל הגעלה: גגור הדחול מגדדו הגל המנתפה/מחכסיל המעלה בעד גגפג הרזדז קמל. פי גרפ הנמו הזרעייה והנתפג הקבלה לעבור, וזגב עלו התהייה בלפרק המנתעה למדה 12 סעה גזפגיה קיבל הדחול מן גדיד מן דון המעדט הווקיה השחשית.

התגזי: יתוגב תגזי המסתחזר במסודע מגלח מחסנז לתגזי המיידט בעידו ען מתנול אדי האطفال והאשכס גיר המוףלין. יתוגב געה המדה הזנדע הגל המסודע פור הגנתה מן הרש ועד תרכה פי החל. **הנסקב המסתחזר:** יתוגב תגפיה המסתחזר הזי הנסקב ברמל או הנשורה תם גמעה ונקה הגל מוקע ללנפגית הסמה.

התעמל מע העיזות הפרגעה: יתוגב שטפ העיזות הפרגעה 3 מרות גזפגה מה השטפ הגל הרזדז פי חויה המרש. וענדה יתוגב הדוס עלו העיזות והלזוה פי חויה הנפגית. ועלו אי חל, לא גגור געה הסתחזר העיזות הפרגעה.

היסעפ הגול:

פי חלה בלע המסתחזר, הנל השכס המסב הגל הווק והגלה יסלפי פי מכן מظلל ומחוי ותחק מן תלפה המסעה הפוריה מן קיבל טיבב וברז אממה הזע הלספה. פי חלה נשוה תלוט פי העינין, יתוגב שטפמה במה גרי הנלפז טילה 15 דקיפה ומרגעה הטיבב. פי חלה נשוה תלוט פי הגד, השטפ המוזע המסב במה והסבוין.

מעלומת לטיבב: המרכז התריי המעלומת ען התסמ, מסתפי רמב, רמק הנהתפ: 7771900 - 04

שروط הביע:

קיע זמן מסוליתנין אן יתופק הזע המנתג מע המוספגת הקימגיתיה הווקע עלו ללספה העיזיה ומע הגדפג המזכורה עלו הללספה וזלכ משרוק בסתחזמה חקט תיבע ללעלמגת הלסתחזר ופי זרופ הלסתחזר העתידייה.

לא תתפיק המסוליה המזכורה געה עלו הללספגת הזי תסתחזר פימה המדה בלחלפ התעלמגת המזכורה עלו הללספה או פי זרופ הלסתחזר גיר העתידייה או פי הזרופ הזי לא ימכנה תופעה. פי מל הזע הללספגת, פינ המסוליה הקמלה תע עלו עתק מן ישתרי המנתג ומן יסתחזר חקט. לן תחמל אי מסוליה אורי, סוה קאנת מבושרה מ גיר מבושרה.

3.5.23

تحضير الرذاذ:
تعبأ حاوية المرشّ بالماء حتّى نصفها. يشغّل الخلّاط وتضاف كمّيّة كونسینتو المطلوبة.
تعبأ الحاوية بالتزامن مع التقليب.

طريقة التطبيق:

المحصول	الآفة	الفارق بين مواعيد الرش	الجرعة (سم ³ /دونم)	حجم الرذاذ	العلاج الأخير قبل القطف	الملاحظات
البطاطا	اللفحة المتأخرة	الفارق بين موעדי رشّ هو 7 أيام	200	الرشّ المتوسّط الحجم 20-60 ل/د	28	
البصل	البياض الزّ غيبي في البصل	7-10أيام	200	30-10 ل/د	14	للحصول على أفضل نتائج، يجب تغطّيه المحاصيل كاملاً
الشمام	البياض الزغبيّ في القرعيّات	7-10أيام	200	30-10 ل/د	7	
الخيار	البياض الزغبيّ في القرعيّات	7-10أيام	200	الرشّ المتوسّط الحجم 25-50 ل/د	7	
	البيثيوم	التطبيق عبر الجذور	0.12 سم ³ من المستحضر لكل شتلة	-		يجب التطبيق خلال 24 ساعة بعد الزراعة

العلاجات المدمجة:
يمكن استخدام المستحضر بالتزامن مع بوليکور 250 م.م. في البطاطا أو مع مسورول في البصل.
قد تؤذي العلاجات المدمجة المختلفة محاصيل أو أنواع نباتات معينة.
قبل رشّ المحاصيل بمحلول مدمج لم تجزيه من قبل، افحصه أولاً بالرشّ على مساحة صغيرة.
وعلى أيّ حال، لا تستخدم أكثر من مستحضرين بالتزامن.

عند نهاية الاستخدام:

تنظيف المرشّ:
عند نهاية الرشّ يجب تفريغ الحاوية من المخلفات بحسب إرشادات التخلّص من مياه الشطف.
بعد ذلك يجب شطف المرشّ وكافة أجزائه بماء ومادّة منظّفة.
يجب التخلّص من مياه الشطف بحسب إرشادات التخلّص منها.

التخلّص من مياه الشطف:
لا يجوز شطف المستحضرات أو البقايا وسكبها من جهاز الرشّ، حاوية التجميع أو أيّ جهاز آخر إلى الأرض، برك الأسماك ومصادر المياه أو أحواض المياه.
يجب التخلّص من مياه الشطف بالطرق المصادق عليها من قبل وزارة حماية البيئة، على سبيل المثال: الرشّ في منطقة زراعيّة، إعادة الاستخدام، التطهير، التبخير والإخلاء إلى موقع المخلفات السامة في رامات حوفاف.

معلومات عامّة:

المستحضر فعّال في مكافحة الأمراض.
يجب التحقّق من تغطية جميع أجزاء النباتات كاملاً.
يتكوّن المستحضر من مركّبين - أولهما هو المركّب الجهازيّ بروباموكارب، الذي يكافح مسبّبي الأمراض اللفحة المتأخّرة والبياض الزغبيّ حتّى بعد دخولهما إلى النبات.
المركّب الثاني، فيناميدون، هو مادّة واقية يتمّ امتصاصها من خلال الأوراق لمكافحة مسبّبات الأمراض التالية:
البياض الزغبيّ، اللفحة المتأخّرة، النوباء والبيثيوم
قبل دخولها النبات، لكنه لا يؤذيها بعد ذلك.
ينتج عن الدمج بين هذين المركّبين المكافحة الكاملة لمسبّبات الأمراض.
كونسينتو مخصّص للرشّ كوسيلة وقائيّة أو للعلاج فور ظهور البقع الأولى المتسبّبة عن اللفحة المتأخّرة أو البياض الزغبيّ.

تعليمات الاستخدام:

التحذيرات:
خطر عند البلع.
مادّة مسبّبة لتهيج العين.

الاحتياطات الوقائيّة:

يجب التعامل مع المادّة واستخدامها بحسب قواعد الحذر الاعتياديّة عند استخدام المبيدات.
يتوجّب ارتداء ملابس العمل الطويلة، وبدلة شغل طويلة مقاومة للموادّ الكيمايّة وكذلك حذاء العمل المغلق، وقيعة لتغطية وحماية الشّعر.
استخدام قفازات النتريل (وفق المعيار EN-374/3) والنظارات الواقية ذات التغطية الكاملة على كلا الجانبين (وفق المعيار EN-166).
يجب الحرص على استخدام قناع نصف الوجه (المعيار EN-140) ذي المصفاة المدمجة (المعيار EN-14387) من نوع ABEK-P3.
يجب الامتناع عن بلع المستحضر واستنشاقه وملامسته المباشرة للجلد والعيّنين.

لا يجوز الأكل، الشرب والتدخين خلال التعامل مع المستحضر.

المخاطر على البيئة:
المستحضر سامّ جدّاً للكائنات المائيّة وقد يلحق الضرر طويل الأمد بالبيئة المائيّة.
امنع الجريان والتطاير إلى برك الأسماك ومصادر المياه.
سامّ للنحل.
يُمنع منمًا بأنّا تطبيق هذا المستحضر في مناطق وأوقات نشاط النحل، ويجب الامتناع عن وصول الرذاذ المتطاير إلى المحاصيل والأعشاب المزهرة المجاورة.

نوسפות بشיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסנה:
לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.
חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.

תכשיר שנשפך:
על תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות:
את האריזות הריקות לשטוף 3 פעמים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס במיכל המרסס.
אח"כ יש למעוך אותן ולהשליכן לפח אשפה.
בכל מקרה אין לעשות באריזות הריקות שימוש חוזר.

עזרה ראשונה:

במקרה של **בליעה**, הוצא את הנפגע לאוויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה מיידית ע"י רופא, והצג בפניו תווית זו.

במקרה של זיהום **בעיניים**, יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא.

במקרה של זיהום **העור**, רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.

מידע לרופא:
המרכז הארצי למידע בהרעלות, בי"ח רמב"ם, טלפון מס': 04-7771900

תנאי מכירה:
אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים.
אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו.
במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד.
כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עליו.

גידול	הנגע	מרווח בין ריסוסים	מינון (סמ"ק/ד"י)	נפח תרסיס	טיפול אחרון לפני קטיף	הערות
תפוח אדמה	כימשון	מרווח בין שני ריסוסים 7 ימים	200	ריסוס בנפח בינוני 20-60 ל"ד/ד'	28	לתוצאות מרביות יש צורך בכיסוי מושלם של נוף הגידול
בצל	כשותית הבצל	7-10 ימים	200	10-30 ל"ד/ד'	14	
מלון	כשותית הדלועיים	7-10 ימים	200	10-30 ל"ד/ד'	7	
מלפפון	מקמקת (פיתיים)	7-10 ימים	200	ריסוס בנפח בינוני 25-50 ל"ד/ד'	7	חובה ליישם תוך 24 שעות משתילה

שילובים:
ניתן לשלב את התכשיר עם פוליקור 250 ת.מ. בתפוחי אדמה.
בגידולים או בזנים מסוימים עלולים שילובים שונים לגרום לפגיעה. לפני ריסוס משקי של שילוב שטרם ניסית, בדוק אותו תחילה בקנה מידה מצומצם.
על כל פנים, אין לערבב יותר משני תכשירים.

ניקוי המרסס:
בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט.
את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים:
אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם.
יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית:
עם גמר הטיפול, יש לרחוץ היטב את הגוף בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים.
יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

כניסה מחדש לשטח:
אפשר להיכנס לשטח/גידול המטופל לאחר התייבשות המוחלטת של התרסיס.
בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאווור 12 שעות

Colors: Cyan Magenta Yellow Black