



פתרונות המומלץ לטיפול הוגמה צריך להיות נקי מושבבים.					
גידול	מידק	מיכון	הערות ושיטות היישום	טיפול אחרוני (ימי)	טיפול לפני תחילת הhogma
נכלי גז***	אנטוסטיגמה	5-10 סמ"ק/ע"צ	בhogma בשליש השני של ההשקייה ורnilה עם תחילת הלבלוב. על עצמות הרגליים בלבד.	30 ימים	
	כינמת קמחיית הגוף	1-2 סמ"ק/ג'ס	בhogma בשליש השני של ההשקייה גnilה עם תחילת הלבלוב. רמת המניין בהתאם לעוצמת הרגליים.	3 ימים	0.3-0.5 סמ"ק/ג'ס
איל*** גראן	ציקחות	15 סמ"ק לעצם בוגר	רישום עד ניראה	40 ימים	בhogma ליד הפטופוט או מתח זום ואחרי כי יש לבצע השקיית החדרה.
	כינימת הפקאן הזכהבה	5 סמ"ק/ע"צ	בhogma בשליש השני של ההשקייה ורnilה בסתו או איבר אחר.	14 ימים	
הדרוקוונית האדומה ל-קנרי*** גראן	הדרוקוונית הדקל האדומה	10 סמ"ק/ע"צ	הגמעה פעם בחודש במשך 3 חודשים עוקבים.	30 ימים	
	הדרוקוונית הדקל האדומה	0.12%	נפח תריסיס 15 ליטר. זילוף לאחר הלולב.	-	
גה***	כינמת הפנטולניה	100 סמ"ק לדונם	בhogma בשליש השני של הרשתקיה ורnilה. שחתת את החומר כאשר ממוצע 20% מהארשקלות מוגעים לפחות. ובמפני שפצפה נוכחות משמעותית של הקיכימה בבססן, בראאמם להוניות המדריך האזרחי.	7 ימים	
עיאליות החסוך בטיפועים מתחילה 10-14 ימים אחר הhogma. שטח המומלץ לטיפול הוגמה צריך להיות נקי מושבבים.					
תפקידו מזכיר את שלבי התפתחות הצעירים של המזוק ומונע התבוסות בעלווה ובפרוי.					
ישר את שביבו הממצא על גבי הפפי בעת ישום התכשיש.					
מיון מועד לעצם מוגבים בפודס החל מגיל 3 שנים. גם עזים לאחר החלפת גז החל מ-3-5 שנים.					
לאור החלפת הגז וניתנים לטיפול במנידה ועצים אלול בעקבות התפתחותםifica וונגעים לנובה של טטר.					
לימוד: בהעדר מידע, מומלץ לא לשלב את התכשיר עם תכشيرים אחרים.					
מושבב	השׂרֶה	المقادير	ملاحظات عامة وطريقة الاستعمال	الموعد الأخير للرش قبل التقصف	moshavet
بطاطا	من الأوراق: من البرقوق، حشرة من القرعيات	٣ سم للدونم	رش	٣٠ يوماً	
ت أرضي	حشرة من القرعيات وحشرة من البرقوق	٥ سم للدونم	بالتجريغ أثناء فترة الإزهار	١٤ يوماً	
نام، بطبع	حشرة من القرعيات	٤ سم للدونم	بالتجريغ أثناء الثلث الثاني من وجبة الري **	٣ يوماً	

3	30	כינמת נש הטבק אבטיח: בשטח גלוי בלבד.	100 סנ' נ/י	CONFIDOR® 350 SC
טיפול לפני קטליך (מיים)	הערות וטיפול היזום	מינון	מידיק	הגידול
30	בהתוגעה בשלוש השיני של החשקייה וגיליה בסתו או באביב.	10 סמ"ק לעץ	כינמה אחורמה ¹	זיהר***
5 חדשים	בהתוגעה בשלוש השיני של החשקייה רינה בסתו או באביב.	10 סמ"ק לעץ	כינמת שעווה פלוודית ²	פרסומן***
30	<p>טיפול אחד בעוגנה, במדזה ושב היסטרורה של כינמה קמחית כדורות בפרדס שיש תחלית את היטרול מוקדם בעונה (נד' לאחר הפירות), אරtheta עם תחלית הופעתה המוקדם בעוגם. ישום ע"י התוגעה בשלוש השיני של החשקייה רינה.</p> <p>טיפול אחד בעוגנה, פדרס עם היסטרורה של גינויות בכינמה אחורמה שי' ישם את התכשיט אמצע חדש אפריל ווד אמצע חדש צמ"י (אחר הרכיה).</p> <p>ישום ע"י התוגעה בשלוש השני של החשקייה רינה.</p> <p>טיפול אחד בעוגנה עם תחלית הלבול, ע"י התוגעה בשלוש השני של החשקייה רינה.</p> <p>עצים צעירים בפרדס, המין תלוי במוד העץ.</p> <p>טיפול אחד בעוגנה עם תחלית הלבול, ע"י התוגעה בשלוש השני של החשקייה רינה.</p> <p>עצים בוגרים בפרדס, המין תלוי במוד העץ.</p> <p>טיפול אחד בעוגנה עם תחלית הלבול, ע"י התוגעה בשלוש השני של החשקייה רינה.</p>	<p>10 סמ"ק לעץ²</p> <p>1 סמ"ק/עץ</p> <p>2-3 סמ"ק/עץ</p> <p>4-10 סמ"ק/עץ</p>	<p>כינמה קמחית כדורית¹</p> <p>כינמה אחורמה¹</p> <p>עש מנהרות ההדר</p>	<p>דרירים***</p>
30	<p>רישוס עד גירה</p> <p>לשטייל במשתלה בתוגעה בשלוש השני של החשקייה גילה.</p> <p>עצים בוגרים במטבע בהתאם למודל העץ, טיפול אחד בעוגנה עם תחלית חקלית הלבול, ע"י התוגעה בשלוש השני של החשקייה רינה.</p> <p>עצים בוגרים עד גל 4 שנים, המין בהתאם למטבע עד גל 4 שנים.</p>	<p>0.05%</p> <p>1 סמ"ק/עץ</p> <p>2-10 סמ"ק/עץ</p> <p>10 סמ"ק/עץ</p> <p>1-5 סמ"ק/עץ</p>	<p>כינמות עליה:</p> <p>כינמת התפקיד הזרקה, כינמת הדולע"ם, כינמת הספירהה</p> <p>כינמת הדם</p> <p>ליתוקוליטס</p>	<p>תפוח**</p>

٣ أيام	بالتجريغ أثناء الثالث الثاني من وجية الري، وليس أكثر من وجبةين في الموسم.	١٠٠ سم ^٢ للدونم	عنة من التبغ من الأوراق: حشرة من البرقوق، حشرة من القرعيات	ندورة، فلفل
١٤ يوماً	بالتجريغ أثناء الثالث الثاني لوجية الري.	١٠٠ سم ^٢ للدونم ٤٠ سم ^٣ للدونم	عنة من التبغ من الأوراق*** من القرعيات	توبالن: بقدونس، قرنيف، قرن، مريمية، قون، زعتر، ش، أوريجانو، ماري، يصل، قوم، كسيرا، نعناع
١٤ يوماً ٢٨ يوماً	بالتجريغ أثناء الثالث الثاني لوجية الري.	١٠٠ سم ^٢ للدونم ٤٠ سم ^٣ للدونم	عنة من التبغ من الأوراق**	برجir
١٤ يوماً	بالتشرب أثناء الثالث الثاني من الري.	١٠٠ سم ^٢ للدونم	ذباقة الورق، ذباقة الطماطم البيضاء	صبل أوراق دجل مدني، أوراق زنث، أوراق زندر أحمر ولبن بلدي (مارد)، أوراق سويت-سوبي
الموعد الأخير للرش قبل القطف	ملاحظات عامة وطريقة الاستعمال	المقادير	الحشرة	حصول حصول
٢ يوماً	عن طريق شبكة التقطيط وأثناء الثالث الثاني من وجية الري وبشبكات الري الفحولية	٤٠ سم ^٣ للدونم	حشرة من الذرة	حلاوة
	استعمال وحيد في الموسم، في حال وجود سوابق إصابة بالبق الدقيقي الكروي في المستان يجب تطبيق العلاج مبكراً (فوراً بعد الإزهار)، والإلا بعد بداية ظهور الآفة في الجذوع.	١٠ سم ^٢ للشجرة ^٢	البق الدقيقي ^١ الكروي ^١	
	استعمال وحيد في الموسم، يستأنف مع سوابق إصابة باللنحرشفي الآخر يجب تطبيق العلاج منتصف شهر نيسان وحتى أواسط شهر أيار (بعد الإزهار)، التطبيق بواسطة التجريغ في الثالث الثاني من وجية الري.	١ سم ^٢ للشجرة	لنحرشفي الآخر ^١ (حشرات قشرية)	
	في مشارق الحمضيات، استعمال وحيد في الموسم عند بداية ظهور النموات وبالتالي تجريغ أثناء الثالث الثاني من وجية الري.	١ سم ^٢ للشجرة		سبات
	للأشجار الصغيرة في البساتين، الكمية حسب كبر وجيل الشجرة.	٣-٢ سم ^٢ للشجرة	ناقبة أوراق الحمضيات (عنة الأنفاق)	

المحصول	الحشرة	المقادير	ملاحظات عامة وطريقة الاستعمال	الموعد الأخير للري قبل القطف
الأزهار ونباتات الزينة*	ثعثعة من التبغ من الأوراق: حشرة من القرعيات، البرقوق من السفيرا	١٠٠ سم ٣ للدونم ٤٠ سم ٣ للدونم	بالتجربة أثناء الثالث الثاني من وجة الري لا يجوز استعمال العلاج أكثر من مرتين بالموسم أو بفترات لا تقل عن الشهر بين الاستعمالين معد للم HASHS المزروعة بالاراضي فقط	-
مار الشمعية نرجس	دبور الدرنات (النتنوات) ذبابة النرجس الكبيرة والصغيرة	٣ سم ٣ للشجرة ٪٠٠٥	- تقظيس المصيلات بعد الجني بمحلول كونفیدور بتتركيز٪٠٠٥ لمدة ١٠ دقائق	-
هار ونباتات الزينة:	جريرا، فيرونيكا، هيبسيكوس، ورود، ليمونيوم ياباني، سوليدستر، سوليداجو، حلبلاب بيهيج، ليرانتوس، جيبيسيت، م. على الرغم من كثرة أصناف الأزهار المذكورة أعلاه ليس باستطاعتنا إجراء فحوصات للعلاج على جميع الأصناف لذا شروع بالرش إجراء فحص على بعض النباتات.			
المحصول	الحشرة	المقادير	ملاحظات عامة وطريقة الاستعمال	الموعد الأخير للري قبل القطف
قطن	ثعثعة من التبغ من الأوراق: حشرة من القرعيات، حشرة من الأنفلون، حشرة من القطانة	١٠٠ سم ٣ للدونم ٤٠ سم ٣ للدونم	عن طريق شبكة التقسيط وأثناء الثالث الثاني من وجة الري وبشبكات الري المقصولة	-
خ، لوز، ***نوف	تسيكادا (نطاط الأوراق)	٪٠٠٥ ١ سم ٣ للشجرة ٢ سم ٣ للشجرة	رش حتى السيلان للأشتال بالمشاتل، استعمال وحيد في الموسم مع بداية ظهور النموات وأثناء الثالث الثاني من وجة الري. الكلية حسب كبر وجيل الشجرة استعمال وحيد في الموسم مع بداية ظهور النموات وأثناء الثالث الثاني من وجة الري.	٣ أيام
تون***	حشرة المن الحرشفى الأحمر	١٠ سم ٣ للشجرة	بالتجربة أثناء الثالث الثاني من وجة الري في موسم الخريف أو الربيع	٣ يوماً
سيمون***	من الشمع الفلوريدي	١٠ سم ٣ للشجرة	بالتجربة أثناء الثالث الثاني من وجة الري في موسم الخريف أو الربيع	٥ شهور
قرعيات التي حصلت على علاج بذور بچاواتشو يجب معاجتها مرة واحدة في الموسم.				
إداً فعالية المستحضر في البيسانين ١٤-١٠ يوماً بعد التطبيق بالتجربة.				
يجب أن تكون المنطقة المعدة للعلاج بالتجربة خالية من الأعشاب.				
ن الأوراق المكافحة في التوابيل: من القرعيات.				

إحضار رقعة المستحضر للطبيب المعالج. في حال تلوث العينين، يجب جيداً بماء حارى نظيف لمدة 15 دقيقة والتوجه الى الطبيب. في حال جلد، اغسل بالماء والصابون.

ت للطبيب: القطري للمعلومات عن التسمم، مستشفى رمبام، هاتف: ٠٤-٧٧٧١٩٠٠.

لبيع: مؤولون عن ملائمة هذا المستحضر للتركيبة الكيماوية لرقعة المستحضر للأهداف المصرح بها على ظهر الرقعة، فقط عندما يتم استعمال حسب التعليمات، في ظروف استعمال عادلة. مسؤوليتنا، المذكورة تسرى في حالات استعمال المستحضر بشكل يخالف التعليمات المدونة أو في ظروف استعمال غير عادلة أو بظروف غير متوقعة لدينا. في مثل هذه، تسرى المسؤلية بكاملها على المشتري وعلى من يستعمل ر فقط. كل مسؤولية أخرى مباشرة أو غير مباشرة، لا تسرى علينا.

دور للكيماويات م.ض. : كميدور للتسيويق م.ض، رمات هشارون ٤٧١٠٠، هاتف: ٠٣-٧٦٠٦٢٢٢

ومتائم لمطروقات المואشرات על גבי התוויות, אך ורק לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה נומ ניתנים לציפוי על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה פה, אינה חלה עליינו.

<p>خول المنطقة من جديد:</p> <p>ي الحقول التي تم معالجتها بالتجريع يمكن الدخول اليها مباشرة، والحقول التي تمت معالجتها بالرش يجب الانتظار حتى يجف المحلول.</p> <p>خزين:</p> <p>جب تخزين المستحضر في مخزن مغلق ومحصّن لتخزين مواد المكافحة، بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأناس غير مرخصين. عند انسكاب مستحضر يجب إكب الرمل أو أي مادة ماصة أخرى، جمعه في وعاء ونقله إلى موقع التخلص من المواد الخطرة.</p> <p>دة العبوات الفارغة:</p> <p>جب شطف العبوات الفارغة جيداً، ٣ مرات على الأقل أو في جهاز شطاف يستعمل ضغط الماء. تخلص من السائل في خزان المرش. أتّقّب وامسح العبوة شطوفة وارميها في حاوية القمامه أو موقع القمامه المرخص.</p> <p>عاف أولى:</p> <p>ي حال البلع، أخرج المصاب من المنطقة المعالجة للهواء الطلق واستلقيه في مكان ظلل ومهوأً وتتأكد من الحصول على مساعدة فورية من طبيب. ليست تلك علامات تسمم مميزة للمستحضر، يمكن أن يكون هناك غثيان</p>	<p>תנאי מכירה: אנו אחראים לכך שמדובר זה תואם את המפרט היכימי של תוויתו כאשר דרך השימוש בו בעשייה בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותו הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגולים או בתהania האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה</p>
--	---

الموعد الأخير للرش قبل الشطف	ملاحظات عامة وطريقة الاستعمال	المقادير للدونم	الحشرة	حصول العنب
٣ أيام	بالتجربة في الثلث الثاني من وجبة الري من بداية ظهور النموات. كمية المستحضر حسب قوة الإصابة. هذه العلاجات تكافح أيضًا التربيس الأحمر السوري.	١-٢ سم للكرمة	البق الدقيقي	تسكادا (نطاط الأوراق)
٤ يوماً	رش حتى السيلان بالتجربة بجانب المنشطات أو الرشاشات وبعد ذلك يجب تطبيق الري بالتنقيط.	٠.٥-٠.٣ سم للكرمة	حشرة من الجوز الصفراء	بيكان ***
١٤ يوماً	بالتجربة أثناء الثلث الثاني من وجبة الري في موسم الخريف أو الربيع.	٣ سم للشجرة	تسكادا العسل	شجار خيل ***
٢٠ يوماً	بالتجربة مرة في الشهر خلال ٣ أشهر متتالية.	٣ سم للشجرة	سوسة النخيل الحمراء	
-	حجم رش ١٥ لتر. تروية منطقة طهور النموات الجديدة.	١٢٪	سوسة النخيل الحمراء	
٧ أيام	بالتجربة أثناء الثلث الثاني من وجبة الري. يجب إعطاء المستحضر عندما يصل في الحصول ٢٪ من الشمار إلى الازهار. وبشرط أن يكون وجود مؤثر للسن في المحسول. حسب تعليمات المرشد اللوائي.	١٠٠ سم ٣ للدونم	حشرة من الفنتولينا	وز ***
بدأ فعالية المستحضر في البستان ١٤-١٠ يوماً بعد التطبيق بالتجربة. جب أن تكون المنطقة المعدة للعلاج بالتجربة خالية من الأعشاب.				
خصي المستحضر على مراحل التطور الأولى للحشرات الضارة. فهو يمنع ترسخه في أوراق النبات وفي الفواكه. المستحضر لا يقضي على الحشرات الموجودة على الفواكه في وقت تطبيقه.				
جريدة مخصصة للشجيرات المثمرة في البيارة، ابتداء من عمر ٣ سنين. يجوز علاج الشجيرات بعد تبديل صنف، اعتباراً من سنوات بعد تبديل كهذا، إذا كانت هذه الأشجار ذات تطور جيد وتصل إلى ارتفاع ٣-٢.٥ أمتار.				
الخلط: لعدم وجود معلومات، من المفضل عدم خلط المستحضر مع مستحضرات أخرى.				

قابلية الخلط: لعدم وجود معلومات، من المفضل عدم خلط المستحضر مع مستحضرات أخرى.
تصحيح النشرة: ٢٠٠٤/١٢
.....ليدور رقم الانتاج