

BAIYER

Confidor[®] 350 SC

קונפידור 350

350 תרכיז רחیق

0.5L net

סיכור: III מסוכן לבריאות
מס' או"מ: 3082

תסניף: III חפר ללסכה
UN 3082 : غیر مصنف

חכיל: 350 גר/ל Imidacloprid
יחורי עלی 350 غم/لتر Imidacloprid الباقی مواد اذابة وترطیب

היתר חומרי דיולו והרטבה
תכשיר סיסטמי רחב טווח להדברת מזיקים מוצצים
במגון גידולם

إقرأ الأصفة بتمعن قبل الاستعمال وتأكد من التطبيق حسبها فقط.
קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה
לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי

לאסלעמאל الزراعي فقط وليس للاسלעמאל البيني

CNI

Harmful



על המורה לשימוש



רשיון השיירות לנהגת האומת: 91 / הצ / 1134
תריכס פסמ الخدمات لوقاية النباتات رقم: 91 / ون / 1134



קונפידור: מביד חשירי جهازي لمكافحة الحشرات الماصة في الخضروات. القطن. البساتين. الكروم. الحمضيات. الورد ومحاصيل حقلية أخرى.

כללי: קונפידור הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת ה"לורניקוטניל", מיועד להדברת מזיקים שונים. התכשיר פועל כרעל קובה ומגע.

הוראות שימוש:

אזהרות: מזיק לגורם לנזק בחשיפה ממושכת וחוזרת.
אמצעי זהירות: יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים בעת השימוש בתכשיר בהתאם לכללי זהירות בחומרי הדברה: בעת הטופול יש להימנע מבלעה, נשימת הרחף ומגע ישיר של החומר עם איברי הגוף ובגדים. בעת טופול עם החומר המרוכז יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע. לסיסוי והגנה על השער, יש להשתמש בעבודה עם התכשיר ההדברה בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3). בעת הטופול בתכשיר יש להשתמש במסכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P ומשקפי מגן (תקן EN-166). אין לשתות, לאכול או לעשן בזמן הטופול.

סכנות לסביבה: מזיק ליצורים השוכנים בסביבה מימית. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. התכשיר רעיל מאוד לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים. בשטח מטופל בקונפידור יש להיכנס רק לאחר שבועיים מיום הטופול.

הנחת התרסיס: מומלץ את מיכל המרסס עד חציו במים. מוסיפים את כמות התכשיר הדרושה למיכל תוך כדי בחישה מתמדת ומוסיפים את יתרת המים.

**אופן היישום בספרון המצ"ב
בגמר השימוש:**

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריית בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לטפול את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף ולשטור את שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, סיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הנהגה אישית: רחץ היטב במים וסבון חלקי גוף שנחשפו לתרסיס ולהחליף בגדים - ואל תלבש שנית את בגדי העבודה בטרום כובסו בכביסה נפרדת.

מועד כניסה מחדש: ביישומי הגמעה ניתן להיכנס מיד לשטח המטופל. ביישומי ריסוס ניתן להיכנס לשטח המטופל עם התייבשות התרסיס. בבתי צמחיה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר במחסן נעול, הימנעו לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים חלולים מוסכמים. תכשיר שנספך - מספיים בחול או בחומר סופג אחר. את החול הספוג יש לאסוף ולסלק לאתר השמדה לחומרים מסוכנים.

טיפול באריות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
עזרה ראשונה: במקרה של בליעה, להוציא את הנפגע לאוויר הצח ולהשכיב במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מיידית ע"י רופא. אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. להביא את תונית התכשיר לרופא המטפל. במקרה של זיהום בעיניים, לטפול היטב במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, לרחוץ במים וסבון.

מידע לרופא: המרכז למידע בהרעלות, ב"ח מב"מ, טלפון מס': 04-7771900
מעלומות ללטיב: מרכז המעלומות פי חאלה التسمم ت: 04-7771900

קונפידור® 350 תרכיז רחיף CONFIDOR® 350 SC

שילובים: בהעדר מידע, מומלץ לא לשלב את התכשיר עם תכשירים אחרים.

משוקע"י: לידור אלמנטס בע"מ, ת.ד. 116 רמת השרון 4710002. טל: 7606222-03

אופן היישום:

הגידול	מזיק	מיבן	הערות ושיטות היישום	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)
*פרחים וצמחי נוי:	חרצית, גרברה, וזניקה, היביסקוס, ורדים, לימוניום יפני, סולידסטר, סולדינו, חלבלוב הזר, לזיאנטוס, גיבסנית, אנרטום.	100 סמ"ק/ד'	הגמעה תבוצע במהלך השליש השני של ההשקיה. אין להשתמש בתכשיר יותר מפעמיים בעונה ובמרווח שאינו קטן מחודש. מיועד לגידולים בקרקע בלבד.	-
		40 סמ"ק/ד'	כנימת עש הטבק	
		3 סמ"ק/צמח	כנימת עש הטבק	
פרח שעווה	צרעת עפצאים	0.05%	טבילת הפקעות לאחר איסוף בתמיסה בעלת ריכוז של 0.05% במשך 10 דקות.	
נרקיס	זבוב הנרקיס הגדול זבוב הנרקיס קטן			

*פרחים וצמחי נוי:

בשל מגוון הזנים הרב של הפרחים הנ"ל אין לנו אפשרות לבדוק בטיחות התכשיר לכל זני צמחים. אם טרם התנסית בתכשיר בזנים השונים, יש לנסות תחילה על מספר מצומצם של צמחים.

הגידול	מזיק	מיבן	הערות ושיטות היישום	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)
תפוח אדמה	כנימות עלה: כנימת האפרסק, כנימת האפון, כנימת הדלועיים.	30 סמ"ק/ד'	יישום ע"י ריסוס והשקיה לאחר מכן.	30
תות שדה	כנימות עלה הדלועיים וכנימת האפרסק	50 סמ"ק/ד'	בהגמעה בתקופת הפריחה	14
מלון, אבטיח	כנימות עלה הדלועיים	40 סמ"ק/ד'	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה. לא יותר מ- 2 טיפולים בעונה.** אבטיח: בשטח גלוי בלבד.	30
	כנימת עש הטבק	100 סמ"ק/ד'		
מלפפון, קישוא	כנימות עלה הדלועיים	40 סמ"ק/ד'	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה. לא יותר מ- 2 טיפולים בעונה.** מלפפון וקישוא: בשטח גלוי חסוי.	3
	כנימת עש הטבק	100 סמ"ק/ד'		
עגבניות, פלפל	כנימת עש הטבק	100 סמ"ק/ד'	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה. לא יותר מ- 2 טיפולים בעונה.	3
	כנימות עלה: כנימת האפרסק, כנימת הדלועיים	40 סמ"ק/ד'		
תבלינים: שמיר, פטרוזיליה, חומצה, מרוה, טרנן, קורנית, מיורם, אורגנו, בזל, חזמרון, ירוק, עירית, ביזל, כוסברה, מנטה	כנימת עש הטבק	100 סמ"ק/ד'	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה.	14
	כנימת הדלועיים	40 סמ"ק/ד'		
חקולה	כנימת עש הטבק	100 סמ"ק/ד'	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה.	28
	כנימת הדלועיים	40 סמ"ק/ד'		

טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)	הערות ושיטות היישום	מינון	מזיק	הגידול	
30	יישום דרך מערכת ספטוף במהלך השליש השני של ההשקיה במערכות מנותקות.	40 סמ"ק/ד'	כנימת עלה התיירס	תירס מתוק	
	טיפול אחד בעונה במידה יש היסטוריה של כנימה קמחית כדורית בפרדס יש להתחיל את הטיפול מוקדם בעונה (מיד לאחר הפריחה), אחרת עם תחילת הופעת המזיק במצעים, יישום ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה רגילה.	10 סמ"ק לעץ ²	כנימה קמחית כדורית ¹	כנימה אדומה ¹	הדרים***
	טיפול אחד בעונה. פרדס עם היסטוריה של נגיעות בכנימה הדומה יש ליישם את התכשיר מאמצע חודש אפריל ועד אמצע חודש מאי (לאחר הפריחה). יישום ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה רגילה.				
	במשתלות הדרים, טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה רגילה.	1 סמ"ק/עץ	עש מנהרות הדר		
	לעצים צעירים בפרדס, המינון תלוי בגודל העץ, טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה רגילה.	2-3 סמ"ק/עץ			
	לעצים בוגרים בפרדס, המינון תלוי בגודל העץ, טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה רגילה.	4-10 סמ"ק/עץ			

טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)	הערות ושיטות היישום	מינון	מזיק	הגידול
14	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה.	100 סמ"ק/ד'	כנימת עלה, כנימת עש הטבק	גידולי עלים - מיזונה, תרד, עלי סלק אדום (בולס בלד ורדציארד), עלי טט-טו
-	יישום דרך מערכת ספטוף במהלך השליש השני של ההשקיה במערכות מנותקות.	100 סמ"ק/ד'	כנימת עש הטבק	כותנה
		40 סמ"ק/ד'		
30	ריסוס עד נגירה לשתיים במשתלה, טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבוב ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה הרגילה.	0.05%	ציקדה יווקה	אפרסקי, שקד, שזיף***
		1 סמ"ק/עץ		
		2-10 סמ"ק/עץ		
30	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה רגילה בסתיו או באביב.	10 סמ"ק לעץ	כנימה אדומה ¹	זית***
5 חודשים	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה רגילה בסתיו או באביב.	10 סמ"ק לעץ	כנימת שעווה פלורידית	אפרסמון***

** דלועים שקבלו טיפול זרעים בנאוצ'ו יש לטפל רק פעם בעונה.
 *** פעילות התכשיר במטעים מתחילה 10-14 יום אחרי היישום בהגמעה.
 שטח המיועד לטיפול הגמעה צריך להיות נקי מעשבים.

הגידול	מזיק	מינון	הערות ושיטות היישום	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)
תפוח ***	כנימת התפוח הירוקה, כנימת הדלועיים, כנימת הספיראה	0.05%	ריסוס עד נגירה	30
		1 סמ"ק/ק"עץ	לשתיל במשתלה בהגמעה בשליש השני של ההשקיה רגילה.	
	10 סמ"ק/ק"עץ	לעצים בוגרים במטע בהתאם לגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה רגילה.		
	5-10 סמ"ק/ק"עץ	לעצים במטע עד גיל 4 שנים, המיון בהתאם לגודל העץ.		
אנס ***	אפנוסטיגמה	5-10 סמ"ק/ק"עץ	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה רגילה עם תחילת הלבוב.	30

*** פעילות התכשיר במטעים מתחילה 10-14 יום אחרי היישום בהגמעה. שטח המיועד לטיפול הגמעה צריך להיות נקי מעשבים.

הגידול	מזיק	מינון	הערות ושיטות היישום	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)
גפן	כנימת קמחית הגפן	1-2 סמ"ק/ק"גפן	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה רגילה עם תחילת הלבוב. רמת המיון בהתאם לעוצמת הניעות.	3
	ציקדות	0.3-0.5 סמ"ק/ק"גפן		
פקאן ***	כנימת הפקאן הצהובה	0.05%	ריסוס עד נגירה	40
		15 סמ"ק לעץ בוגר	בהגמעה ליד הטפספות או מתים ואח"כ יש לבצע השקיית החרדה.	
תמר ***	ציקדת הדבש	5 סמ"ק/ק"עץ	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה רגילה בסתיו או באביב.	14
	חדקונית הדקל האדומה	10 סמ"ק/ק"עץ	הגמעה פעם בחודש במשך 3 חודשים עוקבים.	30
דקל קנרי	חדקונית הדקל האדומה	0.12%	נפח תרסיס 15 ליטר. זילוף לאזור הלולב.	-
בננה ***	כנימת הפנטלוניה	100 סמ"ק לזונם	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה רגילה. יש לתת את החומר כאשר במטע 20% מהאשכולות מגיעים לפריחה. ובתנאי שנצפתה נוכחות משמעותית של הכנימה במטע, בהתאם להנחיות המדריך האיזורי.	7

*** פעילות התכשיר במטעים מתחילה 10-14 יום אחרי היישום בהגמעה. שטח המיועד לטיפול הגמעה צריך להיות נקי מעשבים.

- 1 - התכשיר מדביר את שלבי ההתפתחות הצעירים של המזיק ומונע התבססותו בעלווה ובפרי התכשיר **אנו** מדביר מזיק הנמצא על גבי הפרי בעת יישום התכשיר.
 - 2 - המינון מיועד לעצים מניבים בפרדס החל מגיל 3 שנים. גם עצים לאחר החלפת זן החל נ-3 שנים לאחר החלפת הזן ינתנים לטיפול במידה וצצים אלו בעלי התפתחות יפה ומגיעים לגובה של 2.5-3 מטר.
- שילובים:** בהעדף מידע, מומלץ לא לשלב את התכשיר עם תכשירים אחרים.

كونفيدور® 350 تركيز معلق CONFIDOR® 350 SC

قابلية الخلط: لعدم وجود معلومات، من المفضل عدم خلط المستحضر مع مستحضرات أخرى.

مسوق على يد: ليدور للكيماويات م.ض.، ص.ب. 116 رمات مشارون 47100، هاتف: 03-7606222

طريقة التطبيق:

المحصول	الحشرة	المقادير	ملاحظات عامة وطريقة الاستعمال	الموعد الأخير للرش قبل القطف
الأزهار ونباتات الزينة*	عثة من التبيغ	100 سم ² للدونم	بالتجريع أثناء الثلث الثاني من وجبة الري لا يجوز استعمال العلاج أكثر من مرتين بالموسم أو بفترات لا تقل عن الشهر بين الاستعمالين معد للمحاصيل المزروعة بالأراضي فقط	-
	من الأوراق: من القرعيات من البرقوق من السفيرا	40 سم ² للدونم		
الأزهار الشمعية	دبور الدرناث (النتوات)	2 سم ² للشجرة	-	-
نرجس	ذبابه النرجس الكبيرة والصغيرة	0.05 %	تغطيس البصيلات بعد الجني بمحلول كونفيدور بتركيز 0.05 % لمدة 10 دقائق	-

* الأزهار ونباتات الزينة:

صُفِير، جريرا، فيرونكا، هيببوسكوس، ورود، ليمونيوم ياباني، سوليدستر، سوليداجو، حلابا، بهيج، ليزانتوس، جيبسنت، اجرتوم. على الرغم من كثرة أصناف الأزهار المذكورة أعلاه ليس باستطاعتنا إجراء فحوصات للعلاج على جميع الأصناف لذا وقبل الشروع بالرش إجراء فحص على بعض النباتات.

المحصول	الحشرة	المقادير	ملاحظات عامة وطريقة الاستعمال	الموعد الأخير للرش قبل القطف
بطاطا	من الأوراق: من البرقوق، حشرة من الأفون، حشرة من القرعيات	30 سم ² للدونم	رش	30 يوماً
توت أرضي	حشرة من القرعيات وحشرة من البرقوق	50 سم ² للدونم	بالتجريع أثناء فترة الإزهار	14 يوماً
شمام، بطيخ	حشرة من القرعيات	40 سم ² للدونم	بالتجريع أثناء الثلث الثاني من وجبة الري وليس أكثر من وجبتين في الموسم** الخيار والكوسا: في المزروعات المكشوفة وداخل الدفيئات. البطيخ: في الأرض المكشوفة فقط	30 يوماً
	عثة من التبيغ	100 سم ² للدونم		3 أيام
بنودرة، فلفل	عثة من التبيغ	100 سم ² للدونم	بالتجريع أثناء الثلث الثاني من وجبة الري، وليس أكثر من وجبتين في الموسم.	3 أيام
	من الأوراق: حشرة من البرقوق، حشرة من القرعيات	40 سم ² للدونم		
توابل: شيت، بقونوس، حميض، مريمية، طرخون، زعتر، مردقوش، أوريجانو، روزماري، بصل أخضر، ثوم معمر، ريحان، كسبر، نعاغ	عثة من التبيغ	100 سم ² للدونم	بالتجريع أثناء الثلث الثاني لوجبة الري.	14 يوماً
	من الأوراق*** من القرعيات	40 سم ² للدونم		
جرجير	عثة من التبيغ	100 سم ² للدونم	بالتجريع أثناء الثلث الثاني لوجبة الري.	28 يوماً
	من الأوراق***	40 سم ² للدونم		
محاصيل أوراق - خردل هندي، سبانخ، أوراق شمندر أحمر (بولس بليد وريشارد)، أوراق تيت-سوي	ذبابه الورق، ذبابه الطماطم البيضاء	100 سم ² للدونم	بالتشرب أثناء الثلث الثاني من الري.	14 يوماً

المحصول	الحشرة	المقادير	ملاحظات عامة وطريقة الاستعمال	الموعد الأخير للرش قبل القطف
قطن	عثة من التبغ	١٠٠ سم ^٣ للدوم	عن طريق شبكة التنقيط وأثناء الثلث الثاني من وجبة الري وبشبكات الري المفصولة	—
	من الأوراق، حشرة من القريعات، حشرة من الأفون، حشرة من القطانة	٤٠ سم ^٣ للدوم		
خوخ، لوز، برقوق***	تسيكادا (نطاط الأوراق)	٠.٥٪	رش حتى السيلان	٣٠ يوماً
		١ سم ^٣ للشجرة	للأشغال بالمشاتل، استعمال وحيد في الموسم مع بداية ظهور النموات وأثناء الثلث الثاني من وجبة الري.	
		٢-١٠ سم ^٣ للشجرة	الكمية حسب كبر وجيل الشجرة استعمال وحيد في الموسم مع بداية ظهور النموات وأثناء الثلث الثاني من وجبة الري.	
زيتون***	حشرة المن الحرشفي الأحمر ^١	١٠ سم ^٣ للشجرة	بالتجريع أثناء الثلث الثاني من وجبة الري في موسم الخريف أو الربيع	٣٠ يوماً
أفسيهون***	من الشمع الفلوريدي	١٠ سم ^٣ للشجرة	بالتجريع أثناء الثلث الثاني من وجبة الري في موسم الخريف أو الربيع	٥ شهور

** القريعات التي حصلت على علاج بذور بجاوتشو يجب معالجتها مرة واحدة في الموسم.

*** تبدأ فعالية المستحضر في البساتين ١٠-١٤ يوماً بعد التطبيق بالتجريع.

يجب أن تكون المنطقة المعدة للعلاج بالتجريع خالية من الأعشاب.

**** من الأوراق المكافح في القوايل: من القريعات.

المحصول	الحشرة	المقادير	ملاحظات عامة وطريقة الاستعمال	الموعد الأخير للرش قبل القطف
ذرة حلوة	حشرة من الذرة	٤٠ سم ^٣ للدوم	عن طريق شبكة التنقيط وأثناء الثلث الثاني من وجبة الري وبشبكات الري المفصولة	٣٠ يوماً
حمضيات***	البق الدقيقي الكروي ^١	١٠ سم ^٣ للشجرة ^٢	استعمال وحيد في الموسم. في حال وجود سوابق إصابة بالبق الدقيقي الكروي في البستان يجب تطبيق العلاج مبكراً (فوراً بعد الإزهار)، ولا بعد بداية ظهور الآفة في الجنوع. التطبيق بواسطة التجريع في الثلث الثاني من وجبة الري.	
	المن الحرشفي الأحمر ^١ (حشرات قشرية)		استعمال وحيد في الموسم. بستان مع سوابق إصابة بالمن الحرشفي الأحمر يجب تطبيق المستحضر من منتصف شهر نيسان وحتى أوسط شهر أيار (بعد الإزهار). التطبيق بواسطة التجريع في الثلث الثاني من وجبة الري.	
	ناقبة أوراق الحمضيات (عثة الأنفاق)	٢-٣ سم ^٣ للشجرة	في مشاتل الحمضيات. استعمال وحيد في الموسم عند بداية ظهور النموات والتجريع أثناء الثلث الثاني من وجبة الري.	
			للأشجار الصغيرة في البيارة، الكمية حسب كبر وجيل الشجرة. استعمال وحيد بالموسم عند ظهور النموات الجديدة، بواسطة التجريع في الثلث الثاني من وجبة الري.	
			للأشجار الكبيرة في الحقل، الكمية حسب كبر وجيل الشجرة. استعمال وحيد بالموسم عند ظهور النموات الجديدة، بواسطة التجريع في الثلث الثاني من وجبة الري.	

المحصول	الحشرة	المقادير	ملاحظات عامة وطريقة الاستعمال	الموعد الأخير للرش قبل القطف
تفاح***	من الأوراق: من التفاح الأخضر، من القرعيات، حشرة من السفيرا	٪٠.٠٥	رش حتى السيلان	٢٠ يوماً
		١ سم ^٢ للشجرة	للاشتال بالمشاتل بالتجريع في الثلث الثاني من وجبة الري.	
	١٠-٢ سم ^٢ للشجرة	للأشجار الكبيرة في الحقل حسب حجم الشجرة. علاج واحد في الموسم مع بداية الإزهار، بوسطة التجريع في الثلث الثاني من وجبة الري.		
	١٠ سم ^٢ للشجرة	للأشجار في الحقل حتى جيل ٤ سنوات، الكمية حسب كبر وجيل الشجرة.		
المن القطني	ليتوكوليتس	١-٥ سم ^٢ للشجرة	بالتجريع في الثلث الثاني من وجبة الري مع بداية ظهور النموات.	٢٠ يوماً
أفانوسيجما***		١-٥ سم ^٢ للشجرة		

*** تبدأ فعالية المستحضر في البساتين ١٠-١٤ يوماً بعد التطبيق بالتجريع. يجب أن تكون المنطقة المعدة للعلاج بالتجريع خالية من الأعشاب.

المحصول	الحشرة	المقادير للونم	ملاحظات عامة وطريقة الاستعمال	الموعد الأخير للرش قبل القطف
كروم العنب***	البق الدقيقي تسيكادا (نطاط الأوراق)	١-٢ سم ^٢ للكرمة	بالتجريع في الثلث الثاني من وجبة الري من بداية ظهور النموات. كمية المستحضر حسب قوة الإصابة. هذه العلاجات تكافح أيضاً التربس الأحمر السوري.	٣ أيام
		٢-٣ سم ^٢ للكرمة		
جوز (بيكان)***	حشرة من الجوز الصفراء	٪٠.٠٥	رش حتى السيلان	٤٠ يوماً
		١٥ سم ^٢ للشجرة	بالتجريع بجانب المقطعات أو الرشاشات وبعد ذلك يجب تطبيق الري بالتقطير.	
أشجار النخيل***	تسيكادا العسل سوسة النخيل الحمراء	٥ سم ^٢ للشجرة	بالتجريع أثناء الثلث الثاني من وجبة الري في موسم الخريف أو الربيع.	١٤ يوماً
		١٠ سم ^٢ للشجرة	بالتجريع مرة في الشهر خلال ٣ أشهر متتالية.	
	سوسة النخيل الحمراء	٪٠.١٢	حجم رش ١٥ لتر. تروية لمنطقة ظهور النموات الجديدة.	—
موز***	حشرة من الفنتولينا	١٠٠ سم ^٢ للدونم	بالتجريع أثناء الثلث الثاني من وجبة الري. يجب إعطاء المستحضر عندما يصل في المحصول ٢٠٪ من الثمار الى الازهار. وبشرط أن يكون وجود مؤثر للمن في المحصول، حسب تعليمات المرشد اللوائي.	٧ أيام

*** تبدأ فعالية المستحضر في البساتين ١٠-١٤ يوماً بعد التطبيق بالتجريع.

يجب أن تكون المنطقة المعدة للعلاج بالتجريع خالية من الأعشاب.

١- يقضي المستحضر على مراحل التطور الأولى للحشرات الضارة. فهو يمنع ترسخه في أوراق النبات وفي الفواكه.

إن المستحضر لا يقضي على الحشرات الموجودة على الفواكه في وقت تطبيقه.

٢- الجرعة مخصصة للشجرات المثمرة في البيارة، ابتداءً من عمر ٢ سنين. يجوز علاج الشجيرات بعد تبديل صنف، اعتباراً من ٢ سنوات بعد تبديل كهذا، إذا كانت هذه الأشجار ذات تطور جيد وتصل الى ارتفاع ٢.٥-٣ أمتار.

قابلية الخلط: لعدم وجود معلومات، من الأفضل عدم خلط المستحضر مع مستحضرات أخرى.

كونفيدور ٣٥٠ تركيز معلق

عام: كونفيدور هو مبيد حشري جهازي لمكافحة الحشرات الماصة في الخضروات، القطن، البساتين، الكروم، الحمضيات، الورود ومحاصيل حقلية أخرى.

تعليمات الاستعمال:

تحذيرات: ضار عند البلع. النحل: في المنطقة المعالجة بكونفيدور يجب ادخال النحل فقط بعد اسبوعين من يوم المعالجة. في الرش: المستحضر ضار بالنحل. وسائل الحذر: عند استعماله يجب اتباع قواعد الحذر المتبعة عند استعمال مبيدات مكافحة. يجب ارتداء قفازات مطاطية ونظارات واقية عند التعامل مع المادة المركزة. لا تأكل، تشرب أو تدخن أثناء استعمال المستحضر.

تحضير محلول الرش:

نملاً وعاء الرش بالماء حتى نصفه. نضيف كمية المستحضر المطلوبة للوعاء مع استمرار الخلط ومن ثم نضيف كمية الماء المتبقية.

قابلية الخلط: لعدم وجود معلومات، من المفضل عدم خلط المستحضر مع مستحضرات أخرى.

عند انتهاء الاستعمال:

تنظيف المرش: عند الانتهاء من عملية الرش، يجب تفريغ وعاء المرش من بقايا المستحضر حسب تعليمات إزالة مياه الشطف. بعد ذلك، يجب شطف المرش وجميع أجزائه بالماء ومادة التنظيف. يجب التخلص من مياه الشطف حسب تعليمات إزالة مياه الشطف.

إزالة مياه الشطف:

ممنوع تفريغ وشطف المستحضرات أو البقايا من جهاز الرش، من وعاء التجميع أو من جهاز آخر على الأرض، الى برك أسماك ومصادر مياه على أنواعها. يجب التخلص من مياه الشطف بطرق مصادق عليها من وزارة حماية البيئة، مثل: الرش في حقل زراعي، إعادة الاستعمال، تطهير، تبخير وإخلاء الى موقع القمامة السامة في رمات حوثاف.

حماية شخصية:

غسل اليدين وباقي أعضاء الجسم التي كانت مكشوفة أثناء الرش جيداً بالماء والصابون وتغيير الملابس. ممنوع ارتداء ملابس العمل ثانية قبل أن تُغسل على انفراد.

دخول المنطقة من جديد:

في الحقول التي تم معالجتها بالتجريع يمكن الدخول اليها مباشرة، والحقول التي تمت معالجتها بالرش يجب الانتظار حتى يجف المحلول.

التخزين:

يجب تخزين المستحضر في مخزن مغلق ومخصص لتخزين مواد الكافحة، بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأناس غير مرخصين. عند انسكاب مستحضر يجب سكب الرمل أو أي مادة ماصة أخرى، جمعه في وعاء ونقله الى موقع التخلص من المواد الخطرة.

إعادة العبوات الفارغة:

يجب شطف العبوات الفارغة جيداً، ٣ مرات على الأقل أو في جهاز شطف يستعمل ضغط الماء. تخلّص من السائل في خزان المرش. ألقب وامعس العبوة المشطوفة وارميها في حاوية القمامة أو موقع القمامة المرخص.

اسعاف أولي:

في حال البلع، أخرج المصاب من المنطقة المعالجة للهواء الطلق واستلقيه في مكان مظلل ومهوّاً وتأكد من الحصول على مساعدة فورية من طبيب. ليست هنالك علامات تسمّم مميزة للمستحضر، يمكن أن يكون هنالك غثيان

وتقيؤات. إحضار رقعة المستحضر للطبيب المعالج. في حال تلوّث العينين، يجب شطفها جيداً بماء جاري نظيف لمدة ١٥ دقيقة والتوجه الى الطبيب. في حال تلوّث الجلد، اغسل بالماء والصابون.

معلومات للطبيب:

المركز القطري للمعلومات عن التسمم، مستشفى ريبام، هاتف: ٠٤-٧٧٧١٩٠٠

شروط البيع:

نحن مسؤولون عن ملاءمة هذا المستحضر للتركيب الكيماوية لرقعة المستحضر وملاءمته للأهداف المصرح بها على ظهر الرقعة، فقط عندما يتم استعمال المستحضر حسب التعليمات، في ظروف استعمال عادية. مسؤوليتنا، المذكورة أعلاه، لا تسري في حالات استعمال المستحضر بشكل يخالف التعليمات المدونة في الرقعة أو في ظروف استعمال غير عادية أو بظروف غير متوقعة لدينا. في حالات مثل هذه، تسري المسؤولية بكاملها على المشتري وعلى من يستعمل المستحضر فقط. كل مسؤولية أخرى مباشرة أو غير مباشرة، لا تسري علينا.

المنتج: ليدور للكيماويات م.ض.

التسويق: كميديور للتسويق م.ض.، رمات هشارون ٤٧١٠٠، هاتف: ٠٣-٧٦٠٦٢٢٢

תנאי מכירה: אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו.