



פוליקור 250 מסתحضر عصاري لمكافحة الأمراض الفطرية في الكروم . البساتين. محاصيل الخضروات.

כללי: פוליקור קוטל פטריות מקבוצת הטריאזולים שנקלט ע"י הצמח ומועבר מנקודת הקליטה כלפי מעלה. התכשיר פועל במניעה ובריפוי מחלות רבות, ואף במקרים מסוימים פוליקור פועל להכחדת נגיעות קיימות.

הוראות שימוש:

אזהרות: מזיק בנשימה ובבליעה, קיימת סכנה לעיניים. פוגע בעובר, לא לשימוש ע"י נשים בגיל הפוריות. **אמצעי זהירות:** יש להקפיד על אמצעי זהירות המקובלים בטיפול בחומרי הדברה, יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער.

יש ללבוש כפפות ניטריל לפי תקן (EN-374/3) ומשקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166) מסכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3. יש להמנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר עימו בידיים או בעיניים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

במקרה של שילוב עם תכשיר נוסף, יש להתחשב גם באמצעי הזהירות המפורטים בתווית התכשיר הנוסף.

סכנות לסביבה: רעילות נמוכה לדבורים.

רעיל ליצורים שוכני מים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. עלול לזהם מי תהום.

הכנת התרסיס: ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים. מפעילים את המערבל ושמים את כמות הפוליקור הדרושה. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול.

אופן היישום בספרון המצ"ב בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס, יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים אח"כ יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר הריסוס, יש לרחוץ ידיים וחלקי הגוף שנחשפו לתרסיס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

כניסה מחדש לשטח: עם ההתייבשות המוחלטת של התרסיס. בבתי צמיחה ובמנורות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

איחסון: לאחסן את התכשיר במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.

חומר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר הפסולת הרעילה. **טיפול באריזות ריקות:** שטוף את האריזה היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומערך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מסודר.

עזרה ראשונה: במקרה של בליעה, הוצא את הנפגע לאוויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא והצל בפניו תונית זו. במקרה של זיהום בעיניים, יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900



פתח כאן
افتح هنا



סיווג IV מסוכן
מס' א"י: 3082

תכשיר להדברת מחלות בעל תכונות סיסטמיות

מכיל: 250 גר/ל Tebuconazole

יحتווי 250 גר/ל גרם באלטר

היתר חומרי דילול והרטבה


תצניף: IV חפטר
רפ"מ UN: 3082

נדר היטהר היטב היטב
חשש הטיהור היטב היטב

קרא ללאצקה בנמנען קיבל האסטמאל וטאקד מן האאפיק חסביה אפאק.
קרא בעינו את האוויות לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה

רשיון השיירותים להגנת הצמח: 87 / הצ / 1040
אריאס אפסמ האאמאא לואאיה האנאא 87 / ונ / 1040

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
ללאסטמאל האראעי אפאק וליאס ללאסטמאל האאפא



ליאור אלמנטס בע"מ רח' הנביאים, ת.ד. 116
רמת הארון 4710002 טלפון מס' 03-7606222

Lidorr Elements
מייאור עאור ליאור אלמנטס
ע"י ליעד אגרו בע"מ.

מס' אצווה

Bayer

תعليمات وقائية بعد الاستعمال:

تنظيف معدات الرش:

يجب غسل معدات الرش بعد الاستعمال. والاهتمام بان مياه الغسيل لا تجري الى الحقول المزروعة ومصادر المياه وبرك السمك.

منوع التسبب لتفريغ او غسل المواد وبقاياها الى مصادر المياه بطريقة مباشرة او غير مباشرة كانت. واذا كان حجم الرش اعلى من 150 لتر لا يمكن غسله او تفريغه الا في مكان مخصص لذلك.

الوقاية بعد الاستعمال:

يجب غسل الايدي وجميع اعضاء الجسم التي لامسة المحلول واستبدال ملابس الرش وغسلهما لوجدهما بمواد التنظيف.

الدخول للحقل المرشوش: بعد جفاف المحلول.

التخزين: يجب حفظ وتخزين المستحضر بعبوته الاصلية في مخزن مغلق المعد لتخزين المبيدات بعيداً عن متناول ايدي الاطفال والاشخاص الغير مؤهلين وارجاع المبيد المتبقى للمخزن بعد الاستعمال.

المادة المسكوبة: يجب جمع المستحضر المسكوب بوعاء مغلق ونقله لموقع النفايات السامة.

اتلاف العبوات:

اغسل العبوات الفارغة 3 مرات وافرغ ماء الشطف لداخل وعاء المرش وبعدها يجب تمزيق ورضع العبوات والقائها داخل حاويات القمامة المعدة لذلك.

اسعاف اولي:

في حالة التسمم يجب استلقاء المصاب في مكان مظلل وبالهواء الطلق واستدعاء الطبيب حالاً واحضار تفاصيل المبيد للطبيب.

علامات التسمم:

يمكن حدوث غثيان. تقيء. ووجاع بطن. في حالة تلووث العينين يجب غسلها بالماء لمدة 15 دقيقة وغسل الاعضاء بالماء والصابون جيداً.

معلومات للطبيب: المركز القطري للتسمم مستشفى رماام - هاتف: 04-7771900

شروط البيع:

نحن مسؤولين بان هذا المستحضر مطابق للوصفة الكيماوية التي تظهر على العبوه. وهذا بشرط ان طريقة استعماله مطابقة للتعليمات والاهداف المرفقة وكذلك بطروف استعمال مقبولة لسنا مسؤولين عن الاستعمال الخالف للتعليمات المثبتة على العبوه أو طرق غير ملائمة للاستعمال الصحيح أو غير متوقعة في حالات كهذه تقع المسؤولية على المشتري فقط. واننا غير مسؤولين عن كل نتيجة أخرى كانت مباشرة أو غير مباشرة.

אופן יישום:

הגידול	המחלה	מינון לדונם בסמ"ק או %	יישום התכשיר	ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)
חיטה*	ספטוריה עלי החיטה חילדון	50		60
כותנה	כתמי חלפת	75	מרווחי ריסוס מידי 14 יום, לפי סף פעולה מקובל	21
תירס ממוק/ מספוא	חלדון התירס	75		21
חמנייה	חלדון החמנית	50	טיפול עם התחלת נגיעות בעלים עליונים	21
אגוזי-אדמה	כתמת אגוז אדמה (צ'רקוספורה)	100	מרווחי ריסוס מידי 14 יום	21
גזר	קימחון הגזר כתמי חלפת	75	מרווחי ריסוס מידי 14 יום	21
שום	חלדון הבצל והשום כימיון שקעים (סטמפיליום)	75	מתחילים בטיפול מונע לא יאוחר מהופעת צברי חילדון ראשונים בחלקה או תחילת נגיעות בסטמפיליום	21
בצל	כימיון שקעים (סטמפיליום)	75		21
כרפס	קשיחה גדולה, ספטוריה	75	מרווחי ריסוס מידי 14 יום	21
כרובית, ברוקולי	חלפת המצליבים	75	מרווחי ריסוס מידי 14 יום	21
תפוח-אדמה**	חלפת	75	מרווחי ריסוס מידי 14 יום	21
חימצה	שידפון אסקוכיטה בחמצה	75	חוזרים על טיפול נוסף עם הופעת נגיעות בחמצה	21
עגבניות לתעשייה	קמחנית, חלפת	75	מרווחי ריסוס מידי 14 יום	21
עגבניות חממה	עובש עלים	75	מרווחי ריסוס מידי 14 יום	21
גפן	קימחון הגפן	0.02%	מרווחי ריסוס מידי 14 - 21 יום	21
שזף אירופי	חלדון הגלעיניים	0.02%	מרווחי ריסוס מידי 30 - 21 יום	21
שזף יפני	חלדון הגלעיניים (ריקבון חום (מוניליה)	0.02%	מרווחי ריסוס מידי 21 יום	21
שקד	חלדון הגלעיניים (ריקבון חום (מוניליה) נימיון השקד	0.02%	מרווחי ריסוס מידי 21 יום	21
משמש	חלדון הגלעיניים	0.02%	מרווחי ריסוס מידי 21 יום	21

כדי לשמור על יעילות התכשיר ולדחות הופעת עמידות רצוי להשתמש במחזוריות גם בתכשירים מומלצים אחרים.

* תפוחי-א: התחלת טיפולים לאחר סגירת נוף.

המשך אופן יישום פוליקור 250 ת.מ.:

הגידול	המחלה	מינון לדונם בסמ"ק או %	יישום התכשיר	ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)
הפיריקום	חילדון	מינון: 50 סמ"ק/ד' בנפח תרסיס עד ל- 100 ל"ד' 0.075% בנפח תרסיס יותר מ- 100 ל"ד'	ריסוס לא לפני שהצמח מגיע ל-50 ס"מ גובה. מרווחי ריסוס מידי 14 יום, אין לרסס יותר משני ריסוסים עוקבים בעונה.	-
ציפורן	חלפת הציפורן	0.075% בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד' 75 סמ"ק/ד' בנפח פחות מ- 100 ל"ד'	מרווח מומלץ בין טיפולים 14 - 10 יום	

כדי לשמור על יעילות התכשיר ולדחות הופעת עמידות רצוי להשתמש במחזוריות גם בתכשירים מומלצים אחרים.

שילובים: בגפן: ניתן לשלב את פוליקור 250 ת.מ עם אחד מן התכשירים הבאים: מונגטו 100 ת.ר. (זנים: קריניאן, SBS), דורסן, מסורול, מרפאן, מנגבן, רדומיל, מנצידן. בשזף: ניתן לשלב עם פריניקס 479 ת.מ. בתפוחי-א: עם אפלורד, מנגבן, מנצידן, מנקור. בבצל ושום: מסורול.

יש להשתמש בתוארית המשולבת על פי הוראות השימוש שבתווית התכשיר המשובל. בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים.

פוליקור 250®

מסתחצר עשירי למكافحة الامراض الفطرية في الكروم, البساتين, محاصيل الخضروات.

עמ: פוליקור מביד פטריות טבע לטת התריאזוליים יסתובב וינטטר בעצארه לאعلى النبتة. يكافح ويمنع الامراض الفطرية وايضاً يفعل لآبادة تامة للآصابة الموجودة.

תחזיר: יצר התנפס والبليغ هنالك خطر للعبين. يضر بالجنيين. لا يسمح للنساء باستعماله في فترة الخصوبة **תעלימת الاستعمال:**

وسائل الحذر: ملابس عمل طويله مخصصه للعمل بمواد كيميائيه. حذاء واقى. وطقية للرأس لتغطيه وحمائه الشعر. يجب استعمال كفوف واقية نيتزل (حسب المعيار EN-374/3). عند استعمال المادة يجب لبس كمامه كامله للوجه (حسب المعيار EN-136) مع مصفاه مدمجه مطابقه للمعيار ABEK-P3 (EN-14387) (منوع الاكل, والشرب والتدخين عند استعمال المادة.

وعند معالجه ماده المركزة يجب وضع الكمامه الواقيه. منوع الشرب والاكل والتدخين عند معالجه ماده.

تأثيرات بيئية: سمييه خفيفه للنجل. ملوث للمواد الجوفيه.

تخضير محلول الرش: تخلط الكمية المطلوبة من المستحضر مع الماء وتسكب داخل وعاء المرش المملوء حتى ثلثة بالماء وتضاف كمية الماء المتبقية مع الحفاظ على الخلط المتواصل وفي كل الاحوال عند خلط مادة أخرى يجب اضافتها في الثلث الثاني لكمية الماء في وعاء المرش.

כيفية الاستعمال:

המחصول	الآفة	المقادير للدونم	כيفية استعمال العلاج	الرش الاخير قبل القطف
الحنطة*	صدأ الورق سييتوريا	50 سم 3	—	60 יום
القطن	اللفحة الترנاريا	75 سم 3	بقترات رش כל 14 יום حسب درجة إصابة مقبولة	21 יום
ذرة حلوة ذرة للعلف	الصدأ	75 سم 3	—	21 יום
عباد الشمس	الصدأ	50 سم 3	الرش مع بداية الإصابة	21 יום
الفسنق	تسريקوسپورا	100 سم 3	الرش כל 14 יום	21 יום
الجزر	البياض الدقيقي اللفحة الترנاريا	75 سم 3	الرش بقترات כל 14 יום	21 יום
الثوم	ستيمפילيوم صدأ الأوراق	75 سم 3	البدء بالرش الوقائي بكل الاحوال قبل ظهور الإصابة الاولى بالصدأ والستيمפيليوم	21 יום
سلري	العفن الأبيض سييتوريا	75 سم 3	الرش כל 14 יום	21 יום
بروكولي, زهره	اللفحة	75 سم 3	الرش כל 14 יום	21 יום
بطاطا**	اللفحة الترנاريا	75 سم 3	الرش כל 14 יום	21 יום
بندورة صناعية	البياض الدقيقي اللفحة الترנاريا	75 سم 3	الرش כל 14 יום	21 יום
بندورة في الدفيئات	عفن الأوراق	75 سم 3	الرش כל 14 יום	21 יום
خمس	أسكوخيتا	75 سم 3	الرشة الثانية عند تجدد الإصابة	21 יום

המחصول	الآفة	المقادير للدونم	כيفية استعمال العلاج	الرش الاخير قبل القطف
عنب	البياض الدقيقي	200%	الرش بقترات כל 14-21 يوماً	21 יום
خوخ أوروبي	صدأ	200%	الرش بقترات כל 21-30 يوماً	21 יום
خوخ ياباني	صدأ هونيليا	200%	الرش כל 21 יום	21 יום
لوز	صدأ هونيليا يوليستجما תשחון	200%	—	21 יום
شمش	صدأ	200%	الانتداء بالرش عند وصول البتة لارتفاع 50 سم وبقترات رش كل 14 יום معن الرش أكثر من مرتين في الموسم	—
هيبريكوم	صدأ	50 سم 3/2 بحجم الرش أقل من 100 لتر للدونم أو بتركيز 0.075% بحجم رش أكثر من 100 ل/2	—	—
قرنفل	اللفحة الترנاريا	75% بحجم رش أكثر من 100 ل/2	بقترات رش من 10-14 יום	—

לلمحافظة على فعالیه نأجحه وللمحافظة على المناعه من الفضل استعمال مواد من تركيبه اخرى مسموحه. * الحنطة: بداية الرش للصدأ حسب 25 بقعة صدأ من عينة 100 نبتة وبداية الرش للسبتوريا عند 50% إصابة من

الورقة الرابعة وما فوق. وعدم الرش عند النضوج. **البطاطا: الإنتداء بالرش بعد تكامل كل النמות. قابلية الخطأ: بالعنب يمكن خلطه مع: موفنطو 100 ت.ر (الاصناف المسموحه: كارينيان. sbs).

دورسيان. مسورول. ردميل

السبيستين. سيدان. وأنتركول ومستحضرات ال-BT. بالخوخ يمكن خلطه مع برينكس.

بالطاطا: مع أبلورد. مانفجان. مناسيدان. منكور. بالبصل والثوم: مع مسورول.

في حالة خلطه مع مستحضرات أخرى يجب الاهتمام بالتعليمات المرفقة مع المستحضر الآخر.