



# Luna<sup>®</sup> EXPERIENCE

לונה אקספריאנס SC400 Luna Experience  
תרכיז ורחף

1 ליטר

קוטל פטריות להדרכת מחלות במטעים  
(תפוח, אפרסק, נקטרינה, שקד), גפן ופירות/ירקות  
(פלפל, עגבניה, מלון, אבטיח, קישוא, מלפפון וגזר).

מכיל: 200 גרם לליטר Fluopyram  
200 גרם לליטר Tebuconazole

**סיווג III (מסוכן לבリアות) מס' או"מ: 3082**  
 **לשימוש חקלאי בלבד – לא לשימוש ביתי**  
**للاستعمال الزراعي فقط – ليس للاستعمال المنزلي**

**רישיון האגר להגנת הצומח מס' 16/הצ'5  
4265**

"קראו בעיון את התווית לפני השימוש  
וקפידו על הישום אך ורק על פיה"



כלל:Longitude הוא תכשיר המשלב 2 חומרים פעילים מקבוצות כימיות שונות שהם בעלי מגוון פעולה שונים. החומר הפעיל הראשון הוא פולופיראם, המציג קבוצה כימית חדשה – Pyridylethylamide. חומר זה מעכב אטומים בשරשת הנשימה המיטוכונדריאלית של הפטרייה וכוטזאה מכך משפיע על הפטיריה לאורך שלבים שונים של מחזור החיים.

החויסינזה של הפעיל השני הוא טבוקוזול. זהו חומר סיסטמי השיר לקבוצת מעכבי הבiosisיןשה של הסטרולים.

**ازהרות:** מזיק בבעליה, במגע עם העור ובשאיפה. גורם לנזק חמור בעיניים. עלול לגרום בעור. חדש כפגע בפוריות או בעור אדם. לא לשימוש ע"י נשים בಗיל הפוריות.

**אמצעי זהירות ומיגן:** יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומר הדבירה. יש להקפיד על גדי עבודה אווקטום, סרבול עדמד לכימיקלים וגם געל' שעודה סגורות וכובע ליטוש והגנה על השער. להשתמש עם כפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3) ומשקי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166).

יש להקפיד על שימוש במסמכת חצי פנים (תקן EN-140-3) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג P3. ABEK-P3. יש להימנע מבליעת התכשיר שאיפתת ומכל מגע ישר בעור ובעיניים.

אסור לאכול, לשתוות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

**סכנות ללבב:** אין רעל לדבוריים. רעל מיד לצורמים השוכנים בסביבה מיימת. עלול לגרום להשלכות שליליות לתוך ארגר בסביבה מיימת. אין לרוסס בקרבת מקווי מים או נחלים. מענע דיזימה ורוחף לרבריות דגים ומקרחות מים. עלול להרדם מי תהום. יש להיזהר לבול ישפכו שרירות מן המרסס למקורות מים. יש לפנות את החומר והמיכלים בהתאם להוואות פינוי פסולות מסוכנת. אסור לישם את החומר במרקח של 100 מטר מבנים.

יצין התכשיר: Bayer במפעלים בארה"ב, צרפת וגרמניה.

Manuf. Date : "See on pack"
Expiry Date : 2 YEARS FROM PRO. DATE
Batch No : "See on pack"

Haneviim Str. P.O.B. 116  
LIDORR ELEMENTS LTD.  
TEL. 03-7606222  
47100 Ramat Hasharon



מיוצר ע"מ:  
ידיור אלמנטים בע"מ  
ר'ה הנביא, ת.ד. 116  
רמת השרון 47100  
טלפון מ' 03-7606222

Bayer

עלון חוחה: 12.2.2021



# Luna<sup>®</sup>

## EXPERIENCE

### לונה אקספריאנס SC400 לונה אקספריאנס תוכזוזון

#### הוראות השימוש:

**הכנת התרסיס:** ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים. מפעלים את המערבל ושמים את כמות הלונה אקספריאנס הדרישה. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול.

**אופן היישום:** שטח שטופל בתכשיר ולומם פרימס לא ירוסס בתכשיר בעל מגנן פעול זהה כרייסו עלותי ראשוני. ניתן לרוסס עד

הערות	מועד אחרון לטיפול (ימים)	נפח תרסיס (ליטר לדונם)	המינון	המחלה	הגידול
יש לדאוג לכיסוי טוב של כל הנוף בעת הריסוי.	7	100-120	0.04% גרם -> 100 ליטר(40)	קימוחן האפרסק	אפרסק, נטטרינה
	7	100-120	0.04% גרם -> 100 ליטר(40)	חולדרן הגלעניים	אפרסק, שיזף
	14				שקד
	7	100-160	0.035% גרם -> 100 ליטר(35)	קימוחן התפוח גרב התפוח ריקבון קליפה (אלטנරירה חיצונית)	תפוח
	7 <sup>3</sup>	100	0.035% גרם -> 100 ליטר(35)	קימוחן הgefן	gef <sup>1,2</sup>
	3	20-50	40 סמ"ק/דונם	קימוחן הדלועיים	מלון, מלפפון, קישוא
	7	20-30			אבטיח
	3	30-100	50 סמ"ק/ד'	קימוחנית	עגבניה
	7	30-100	50 סמ"ק/ד'	ק'ימוחנית	פלפל
	14	20-30	50 סמ"ק/ד'	ק'ימוחן הגזר	גזר

1. אין לרוסס בגפן לאחר שלב BBCH 73= שלב סוף חנובה, ראש גפרור.

2. אין לרוסס כרם גפן חסוי.

3. אף על פי שמצוינים 7 ימי המנתנה כמועד אחרון לטיפול בגפן, מועד הריסוס ציריך להתבצע אך

ורק על פי סעיף 1 הניל.

**שילובים: בתפוח (זנים: סטארקינגן, זהוב וריאיל-גלאקטיס) ניתן לשילבו עם התכשיר.**

מורפאן 50 א.ר..



## Luna<sup>®</sup> EXPERIENCE

### לונה אקספריאנס SC400 S לונה אקספריאנס תרci רוחן

יש להשתמש בתאריר המשולבת על פי הוראות השימוש שבתוית התכשיר המשולב. השילובים נבדקו רק בזן שצון, יש לבדוק את השילוב בזנים אחרים לפני ריסוס מסחרי. בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים.

#### במקרה השימוש:

**יע唧ם המשיסו:** בוגר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לשילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים וודרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לשילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שרירות ממתיקן ריסוס, מיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקrukע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומיוי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות.newaxisן על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח וקלאי, שימוש טיחור, אידי ויפוי לאטר הפסולת הרעליה ברמת גבוהה.

**הנoga אישית:** עם גמר הטיפול, יש להרוחץ היטב את הגוף בפרט את החלקות שבו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לבסס את גדי העובדה בפזרד ולמקות את ציז'ה המגן בעדרת דטרגנט.

**כינסה חדש לשיטה:** אפשר להיכנס לשחיה/גידול המטופל 12 שעות לאחר סיום הריסוס והתיישבות התרטיס על הצמחים. בbatis' צמיחה ומגנה רוחנית עבירות יש לא Orr 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפחות למשך מועד מן איש.

**אחסנה:** שמור את התכשיר באזיזה מקורות, סגורה היטב. לאחסן את התכשיר במחום ועל המזעע לאחסן חמורי הדבירה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עדף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להאריך בשדה.

**טיפול באירועות ריקות:** את האירועות הריקות לשטוף 3 פעמים ולהוסיף את מי השטיפה לתרטיס במיכל המרסס. אוח"כ יש למעורר אותן ולהשליכן לפח אשפה. בכל מקרה, אין לעשות באירועות הריקות שימוש חזזר.

**עדירה ראשונה:** במקרה של **בליעת**, הוציא את הנפגע לאוויר הצעיר והשכיבו במקום מוצל ומאורר וdag לקבלת עזרה מידית ע"י רופא, והציג בפניו תווית זו. במקרה של **דיאום בעיניים**, יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של **דיאום העור**, רחץ בימי ובוון את המקום שנפגע.

**טיפול לרופא:** המרכז הארצי למידע רפואי, ב"ח רמב"ם טלפון מס': 04-7771900

**תנאי מכירה:** אנו אחראים רק למוצר זה בהתאם לתקוית האזיזה ומתחייבים למטרות המוצהרת על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחראיתנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר הנגdot את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפיה על ידך. במקרים מעין אלה, חלה האחראיות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחראיות אחרת שירה או עקייה, אינה חלה עליינו.

عام:

لونا هو مستحضر يجمع مادتين فعاليتين من مجموعتين كيميائيتين مختلفتين لهما آلية عمل مختلفة. المادة الفعالة الأولى هي فلوبيرام، التي تمثل مجموعة كيميائية جديدة – Pyridylethylamide. هذه المادة تتبط إنزيماً في سلسلة الميتوكوندريا التنسوية للفطر، و كنتيجة لذلك تؤثر على الفطر على امتداد مراحل مختلفة من دورة الحياة.

المادة الفعالة الثانية هي تبيوكونازول. وهي مادة جهازية تنتمي إلى مجموعة مثبطات التخليق الحيوي للستيروولات.



التصنيف: III (خطر على الصحة)  
رقم الأمم المتحدة: 3082

ليس للاستخدام المنزلي – للاستخدام الزراعي فقط

بترخيص من شعبة حماية النبات رقم: 4265/الـ/16

صنّع من قبل:

مُصنّع المستحضر: **Bayer** في مصانع في الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا وألمانيا.

Haneviim Str. P.O.B. 116  
LIDORR ELEMENTS LTD.  
TEL. 03-7606222  
47100 Ramat Hasharon



لیدور کیمیکالز مض.  
شارع هنفيت، ص.ب. 116  
رمات هشaron 47100  
رقم الهاتف: 03-7606222



# Luna® EXPERIENCE

لونا أكسپرينس SC400 لونا إكسبرينس  
ترسيو و هي

1 لتر

## لونا إكسپرينس SC400 مركز معلق

مبيد فطريات القضاء على الأمراض في البستين  
(تفاح، خوخ، نكتارين، لوز)، عنب وفواكه/خضروات  
(فلفل، بندورة، شمام، بطيخ، كوسا، خيار وجزر).

يحتوي: 200 غرام للتر  
Fluopyram  
200 غرام للتر  
Tebuconazole

”اقرأ البطاقة بامان قبل الاستخدام واحرص على التطبيق بحسبها فقط لا غير.”

Bayer



# Luna<sup>®</sup> EXPERIENCE

לונה אקספריאנס SC400 **לונה אקספריאנס**  
טורכי רוחץ

## تعليمات الاستخدام:

**تحذيرات:** يلحق الضرر عند ابتلاعه، عند ملامسته الجلد و عند استنشاقه. يؤدي إلى ضرر شديد في العينين. من الممكن أن يؤدي إلى تهييج الجلد. يشتبه في أنه يضر بالخصوصية أو بجنسين الإنسان. مننوع أن تستخدeme نساء في سن الخصوبة.  
**تدابير وقائية:**

يجب معالجة المادة واستخدامها وفقاً لقواعد الحذر المتنعة في استخدام المبيدات. يجب الحرص على ارتداء ملابس عمل طويلة، بدلة مقاومة للمواد الكيميائية وكذلك أحذية عمل مغلقة، وقبعة لتنفطية الشعر وحمايته. يجب ارتداء قفازات تنزيل (وفقاً للمعيار EN-374/3) ونظارة واقية مغلقة من الجانبين (وفقاً للمعيار EN-166).

يجب الحرص على استخدام قناع نصف الوجه (وفقاً للمعيار EN-140) مع فلتر مدمج (وفقاً للمعيار EN-14387) من نوع P3 ABEK-P3. يجب الامتناع عن ابتلاع المستحضر واستنشاقه وعن أي ملامسة مباشرة له للجلد أو للعينين.

**مخاطر على البيئة:** غير سام للنحل. سام جدًا للكائنات الحية التي تعيش في بيئه مائية. من الممكن أن يؤدي إلى أثار سلبية في البيئة المائية على الأمد الطويل. مننوع رشه بالقرب من تجمعات المياه أو الجداول. امنع تدفقه إلى برك الأسماك ومصادر المياه وتظايره فوقها. من الممكن أن يؤثر المياه الجوفية. يجب الحذر من عدم انسكاب بقایا من المرش في مصادر المياه. يجب إخلاء المادة والحاويات وفقاً لتعليمات إخلاء النفايات الخطيرة.

مننوع استخدام المادة على مسافة **100** متر من المباني.  
**تحضير محلول الرش:**

يجب ملء حاوية المرش بالماء حتى نصفها. بعدها يجب تشغيل الخلط وضع كمية اللونا إكسبريانس المطلوبة. ثم الاستمرار في ملء الحاوية بالماء مع الخلط في أثناء ذلك. طريقة التطبيق: المنطقة التي عولجت بمستحضر فيلوم برام لا يجوز رشها بهذا المستحضر أو بمستحضر ذي آلية عمل مماثلة محلول أول رش أوراق الشجر. في الإمكان الرش حتى رشتين متتاليتين بفواصل زمني لا يقل عن 7 أيام.



# Luna<sup>®</sup>

## EXPERIENCE

לונה אקספריאנס SC400 Luna Experience  
תרcit ויח'

المحصول	الإفقة	الجرعة	حجم محلول الرشّن (لنتر للدونم)	الموعد الأخير للمعالجة (أيام)	ملاحظات
الخوخ، التكثرين	البياض الدقيق على الخوخ	0.04% (40 غراماً لكل 100 لتر)	100-120	7	يجب الاهتمام جيداً بتنعيمية المنظر الطبيعي بكامله عند الرشّ.
الخوخ، البرقوق	صدأ النوى	0.04% (40 غراماً لكل 100 لتر)	100-120	7	
اللوز				14	
التفاح	البياض الدقيق على التفاح جزب الفلاح تعفن القشرة (اللناريا خارجية)	0.035% (35 غراماً لكل 100 لتر)	100-160	7	
العنب	البياض الدقيق على العناب	0.035% (35 غراماً لكل 100 لتر)	100	7 <sup>3</sup>	
الشمام، الخيار، الكوسا	البياض الدقيق على القرع	40 سم مكعب/دونم	20-50	3	
البطيخ			20-30	7	
البندرة	البياض الدقيق	50 سم مكعب/دونم	30-100	3	
فلفل	يُفقدنا ضبابياً	50 سم مكعب/دونم	30-100	7	
الجزر	البياض الدقيق على الجزر التبيغ الانتراري	50 سم مكعب/دونم	20-30	14	

1. منوع الرشّ في العناب بعد مرحلة BBCH 73 = مرحلة نهاية النضج.

2. منوع رشّ كرم عنب مغلي.

3. على الرغم من أنه ذكر 7 أيام انتظار كموعد أخير لمعالجة العناب، فإن موعد الرشّ يجب أن يكون بحسب البند 1 أعلاه، فقط لا غير.

دمجات: في التفاح (أصناف: ستاركينغ، أصفر ورويال-غلاكسي)، يمكن دمجه مع المستحضر:

مرفان 50.



# Luna<sup>®</sup> EXPERIENCE

## לונה אקספריאנס SC400 Luna Experience תרcit רוחץ

يجب استخدام الوصمة الدمجة وفقاً لتعليمات الاستخدام التي في بطاقة المستحضر الدمج.

الدمحات فُحصت في الأصناف المذكورة فقط، يجب فحص الدمح في أصناف أخرى قبل الرش التجاري.

في حال عدم وجود معلومات إضافية يُمنع دمج هذا المستحضر مع مستحضرات أخرى.

### عند الانتهاء من الاستخدام:

**تنظيف المرشّن:** عند الانتهاء من الرش يجب إخلاء الحاوية من البقايا وفقاً لتعليمات التخلص من محلول المتبقي، بعد ذلك يجب شطف المرشّن وجميع أجزائه بالماء وبمادة تنظيف. يجب التخلص من محلول المتبقي وفقاً لتعليمات التخلص من محلول المتبقي.

**التخلص من محلول المتبقي:** يُمنع إفراغ وشطف مستحضرات أو بقايا من مهارز رش، أو من حاوية تجميع أو من أي جهاز آخر إلى الأرض، إلى برك الأسماك وإلى مصادر المياه والتجمعات المائية بمختلف أنواعها. يجب التخلص من محلول المتبقي باستخدام الأساليب المصادق عليها من قبل وزارة حماية البيئة، مثل: الرش في أرض زراعية، إعادة الاستخدام، التقىحة، التبخير والإخلاء إلى موقع النفايات السامة في رمات حوفاف.

**الحماية الشخصية:** عند نهاية المعالجة، يجب غسل الجسم جيداً، وخصوصاً الأعضاء التي كانت مكشوفة عند الرش وتبييل الثياب. يجب غسل ملابس العمل بشكل منفرد وتنظيف المعدات الواقعية بمساعدة مادة تنظيف.

**الدخول إلى المنطقة من جديد:** من الممكن الدخول إلى المنطقة المحسوبة المعلج بعد انتهاء 12 ساعة على الرش وجفاف المستحضر المرشوش النباتات. في بيوت النمو والأفاق الزراعية المغطاة يجب التهوية لمدة 12 ساعة إضافية بالأساليب المتبعة، قبل الدخول إليها من جديد بدون معدات وقاية شخصية.

**التغزيرين:** لحفظ المستحضر في عبوته الأصلية وهي مغلقة جيداً، احفظ المستحضر في مخزن مغلق مخصص لتخزين المبيدات، بعيداً عن متناول أيدي الأطفال والأشخاص غير المؤهلين. يجب إرجاع المادة الزائدة إلى المخزن فور الانتهاء من الرش ومنع تركيها في الحقل.

**المستحضر المنسيك:** إذا انكسر المستحضر يجب إقالة الرمل أو نشرة الخشب عليه، ثم جمعه ونقله إلى موقع النفايات السامة.

**معالجة العيوب الفارغة:** يجب شطف العيوب الفارغة 3 مرات وإضافة ماء الشطف إلى مادة الرش في حاوية المرشّن. بعد ذلك، يجب سحق العيوب ورميها في دلو القمامه، في أي حالة، لا تجوز إعادة استخدام العيوب الفارغة بأي شكل.

**الإسعاف الأولي:** في حالة **البلع**، أخرج المصاص إلى الهواء النقي واجعله يستلقى في مكان مظلل ومهوى، واهتم بالحصول على مساعدة فورية من قبل طبيب، واعرض أمامه هذه البطاقة، في حالة **תלות העיניים**، يجب شطفهما بالماء المتدققة النظيفة لمدة 15 دقيقة والتوجه إلى الطبيب. في حالة **תלות הגוף**، اغسل الموقع المصاص بالماء والصابون.

**معلومات للطبيب:** المركز القطري للمعلومات في حالات التسمم، مستشفى رمبام، رقم الهاتف: 04 - 7771900.

### شروط البيع:

نحن مسؤولون عن كون هذا المنتج متوافقاً مع المواصفات الكيميائية لبطاقة العبوة وملائماً للأهداف المقصود بها على بطاقة العبوة، وذلك فقط عندما تتم طريقة استخدامه وفقاً لتعليمات، في ظروف استخدام عاديّة. لا تسرى مسؤوليتنا، كما ذكر أعلاه، في حالات استخدام المادة بطريقة تتعارض مع الإرشادات الواردة في بطاقات المنتج أو في ظروف استخدام غير عاديّة أو في الظروف التي لا يمكننا أن نتوقعها. في مثل هذه الحالات، تقع المسؤلية بالكامل على مشترى المنتج ومستخدمه فقط. إن أي مسؤولية أخرى، مباشرة أو غير مباشرة، لا تسرى علينا.

**عام:**

لونا هو مستحضر يجمع مادتين من مجموعتين كيميائيتين مختلفتين لهما آلية عمل مختلفة. المادة الفعالة الأولى هي فلوبيرام، التي تمثل مجموعة كيميائية جديدة – Pyridylethylamide. هذه المادة تتربط إنزيمياً في سلسلة الميتوكوندريا التنسجية للفطر، و كنتيجة لذلك تؤثر على الفطر على امتداد مراحل مختلفة من دورة الحياة. المادة الفعالة الثانية هي تبيوكنازول. وهي مادة جهازية تنتمي إلى مجموعة مرتبطات التحليق الحيوي للستيروولات.

**التصنيف: III (خطر على الصحة)**  
**رقم الأمم المتحدة: 3082**



**ليس للاستخدام المنزلي – للاستخدام الزراعي فقط**

**بترخيص من شعبة حماية النبات رقم: 4265/الجز/16**

**صنع من قبل:**

**مُصنّع المستحضر: Bayer** في مصانع في الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا وألمانيا.

لیدור קומפאלם בעמ.  
شارع هتفنبي، ص.ب. 116  
رمات هشارون 47100  
رقم الهاتف: 03-7606222



Haneviim Str. P.O.B. 116  
LIDORR ELEMENTS LTD.  
TEL. 03-7606222  
47100 Ramat Hasharon



# Luna® EXPERIENCE

لونا أكسبريانس SC400 لونا إكسبرينس  
ترسي روبي

1 لتر

## لونا إكسبريانس SC400 مركز معلق

مبيد فطريات للقضاء على الأمراض في البساتين  
(تفاح، خوخ، نكتارين، لوز)، عنب وفاكه/خضروات  
(فلفل، بندورة، شمام، بطيخ، كوسا، خيار وجزر).

يحتوي: 200 غرام للتر Fluopyram  
200 غرام للتر Tebuconazole

“اقرأ البطاقة بامانع قبل الاستخدام واحرص على التطبيق بحسبها فقط لا غير.”

Bayer