



VELUM[®] PRIME ולום פריים[®] פילום

* לאחר יישום ולום תיתכן הופעת הילה צהובה בשולי העלה ו/או במרכז ו/או נקודות נקרוטיות. תופעות אלו אינן משפיעות על התפתחות הגידול.
גידולים עוקבים: ייתכנו שאריות חומר פעיל בגידול עוקב.

בגמר השימוש:

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל אסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית: רחץ היטב במים וסבון חלקי גוף שנחשפו לתכשיר ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

מועד כיסוי מחדש: אפשר להיכנס לשטח המטופל 12 שעות לאחר היישום. בתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר במחסן נעול, המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום היישום ואין להשאירו בשדה אפילו אם יודקו לו שוב למחרת.

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריוות ריקות: שטוף את האריוה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפך את התשטוף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריוה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה:

במקרה של **בלעיה**, להוציא את הנפגע לאוויר הצח ולהשכיבו במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא. אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל.

במקרה של **זיהום בעיניים**, לשטוף היטב במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של **זיהום העור**, לרוחץ במים וסבון.
מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, ב"ח רמב"ם טלפון מס': 04-7771900.

תנאי מכירה:

אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריוה ומתאים למטרות המוצגות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו.

Bayer

IL84439630A

תאריך עדכון: 07.2021

כלל:
ולום פריים הינו תכשיר הקוטל נמטודות השייך לקבוצה כימית חדשה - Pyridylethylamide. החומר הפעיל פלואפירם מעכב את קומפלקס II של שרשרת הנשימה במיטוכונדריה של נמטודות. עיכוב שרשרת זו גורם לצמצום מהיר ומשמעותי של האנרגיה ברמה התאית בנמטודה.

הוראות השימוש:
אזהרות: מטוכן בבליעה, עלול לגרום לתגובה אלרגית.
אמצעי זהירות: יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי ההירות המוקבלים בשימוש בחומרי הדברה.

יש להקפיד על בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכבוע לכיסוי והגנה על השערה. להשתמש בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3) ומשקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166). יש להקפיד על שימוש במסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3.

יש להימנע מבליעת התכשיר ושיאיתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול. בתכשיר.

סכנות לסביבה: אינו רעיל לדבורים. רעיל מאוד ליצורים השוכנים בסביבה מימית. עלול לגרום להשפעות שליליות לטווח ארוך בסביבה מימית. אין לטפל בקרבת מקווי מים או נחלים. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ומקורות מים. עלול לזוהם מי תהום. יש להיזהר לבל ישפכו שאריות מן המרסס למקורות מים. יש לפנות את החומר והמכלים בהתאם להוראות פינוי פסולת מוסכמת.
אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:

- מגבלה הצפונה של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו המים.
 - מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הגומצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים.
 - מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.
- לא בכללות באיסור זה חלקות בקו: שיעור חרסית הקרקע הוא 15% ויותר, או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.

אופן היישום: אין ליישם ולום בשעות החמות של היום ובימים עם טמפרטורה גבוהה לעונה. אין ליישם ולום יותר מפעם אחת בשנה באותו שטח. שטח שטופל בולום פריים לא יטופל בריסוס עלויתי ראשון עם קוטל מחלות בעל מנגנון פעולה זהה (SDHI) לולום פריים כגון: לונה אקספריאנס, לונה טרנקויליטי וחומרים המכילים בוסקליד.

הגידול	הפגע	מינון	יישום התכשיר	מועד היישום	מועד אחרון לטיפול (ימים)
עגבנייה	נמטודות יצרות עפצים (Meloidogyne spp)	130 סמ"ק/ד'	יישום בודד בכימיציה. יש ליישם בשלש השני של מנת ההשקיה	3 ימים אחרי שתילה או במהלך הגידול	3
פלפלי*	נמטודות יצרות עפצים (Meloidogyne spp)	130 סמ"ק/ד'	יישום בודד בכימיציה. יש ליישם בשלש השני של מנת ההשקיה	לאחר שתילה	3
	נמטודה נודדת (Pratylenchus capsici)	65 סמ"ק/ד'	שני יישומים בכימיציה. יש ליישם בשלש השני של מנת ההשקיה	יישום ראשון 3 ימים לפני שתילה יישום שני 30 יום משתילה	3

הערה: יש להתקין מערכת זרם אל חוזר (מז"ח) בזמן יישום דרך מערכת ההשקיה.

יישום ראשון 3 ימים לפני שתילה



VELUM[®] PRIME ולום פריים[®] פילום

1 ליטר

ולום פריים[®] 400 תרכיז רחף Velum Prime[®] 400 SC

תכשיר להדברת נמטודות בעגבנייה ופלפל
סיווג: III (מסוכן לבריאות) מספר או"ם: 3082

מפיל: 400 גרם לליטר Fluopyram

היתר חומרי גידול והרטבה

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי

⚠️

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
הקפד על היישום אך ורק על פיה
ברשיון האגף להגנת הצומח מס' 19/הצ/4356

LIDORR ELEMENTS LTD.
Haneviim Str. P.O.B.116
4710002 Ramat Hasharon
TEL. 03-7606222



לידור אלמנטס בע"מ
רח' הנביאים, ת.ד. 116
רמת השרון 4710002
טלפון מס' 03-7606222

יצרן התכשיר: Bayer AG
במפעל בגרמניה