

# CONFIDOR® 350 SC

## Lawn & Garden Insecticide

**Protects Lawn against Scarabs and Mole crickets. Protects as well trees, ornamental plants and flowers in gardens against insects as whitefly, leafhoppers**

**DOMESTIC GARDEN USE PURPOSES ONLY. FOR PLANT TREATMENT ONLY.**

License of the Plant Protection Services No. 1379/HZ/95

Instructions for use

Read the label carefully before use

UN No. 3082

Classification: III (dangerous for health)

**Contains:** 350g/l Imidacloprid  
The remainder includes wetting agents and diluting materials

**Volume:** 10 cc (for 100m<sup>2</sup> lawn size); 15cc (for 150m<sup>2</sup> lawn size);

**Properties:** Confidor is a systemic preparation which belongs to the new Chloronicotinyl group for the control of various insects in flowers, ornamental plants, pome and stone fruit trees. The active ingredient acts as a stomach and contact poison. CONFIDOR is taken up by the roots and transported systemically with the plant's mineral sap flow to its canopy. This action rapidly kills various insects.

**Warnings:** Harmful if swallowed. May cause damage with prolonged and repeated exposure.

### Protection and means of precautions:

- Avoid contact of material with exposed parts of body, mouth and eyes.
- Do not eat, drink or smoke while working.
- Wear latex gloves, protective clothing and goggles when dealing with the concentrated material.
- Make sure to send away of operator breeze of pesticide while spraying.
- It is recommended to spray early in the morning or evening when there's no breeze nor people or animals in the area.
- After the application in lawn – do not step on lawn until it is completely dry of irrigation.



**Environmental hazards:** Hazardous to bees (in spray application). Hazardous to aquatic life organisms. Avoid dispersing material close to water sources (lakes, creeks, streams, or water features).

### Application instructions for treating Lawn and areas with cover plants:

1. Shake well before use.
2. Open the cover by pressing and turning it anti-clockwise.
3. Acquire the required quantity of Confidor with the syringe which is inside the box.
4. One should set the amount of water to dilute Confidor by a trial spraying of the area with water. This amount of water is the amount to dilute the recommended quantity of Confidor. If the amount of water is higher than the spray volume, One should divide the application in several sprayings and accordingly the Confidor and water.
5. Pour the required quantity of Confidor into the sprayer.
6. Add the amount of water that was set by trial while mixing.

### Application instructions to treat trees and ornamentals:

1. Shake well before use.
2. Open the cover by pressing and turning it anti-clockwise.
3. Draw the required amount of Confidor per treatment with the syringe.

### For lawn and covering plants (irrigated by sprinklers):

- Spray the Lawn. Shake the sprayer from time to time when spraying.
- Make sure to send away of operator breeze of pesticide while spraying.
- It is recommended to spray early in the morning or evening when there's no breeze nor people or animals in the area.
- Irrigate immediately after spraying in the amount of 1m<sup>3</sup> for 100m<sup>2</sup>.

### Plants irrigated by drip irrigation:

Open the irrigation system for 1/3 time of regular irrigation time. Dig little pits in the wet areas under the drip. Pour with the syringe the right amount of Confidor into the pit and cover up. Keep irrigating till the irrigation is completed. The material should be absorbed by the plant's roots.

### Trees that are not irrigated:

Dig little pits around the tree in a 2/3 distance from the stem to tree canopy. Pour with the syringe the right amount of Confidor into the pits and cover up. Irrigate each pit with hose for few minutes till the material is absorbed by the roots of the plant.

### Ornamentals and Vegetables not irrigated by drip irrigation:

Pour the required quantity into funnel or bucket. Add water at a rate of 1Lit water to each 0.5cc while mixing. Irrigate the plants with material and add regular irrigation.

**Cleaning of sprayer and injector:** Rinse thoroughly with water and store.

Crop	Pest	Dosage	Comments and application methods	Last treatment before picking
Lawn	Mole cricket, Scarabs (Pentadon sp., Phyllopetra sp.)	<b>By spraying</b> Use 10cc Confidor in 3 lit water for 100m <sup>2</sup> lawn	Irrigate the lawn immediately after application at a rate of 1mcube for each 100m <sup>2</sup> (10mm water)	
Flowers and Ornamentals used as garden bed cover: Chrysanthemum, Gerbera, Veronica, Japanese Limonium, Solidaster, Solidago, Euphorbia, Lisianthus, Gypsophila, Agaratum	Whitefly, Aphids, Leafhoppers, Thrips	<b>By spraying</b> Use 10cc Confidor in 3 lit water for 100m <sup>2</sup> if the garden is irrigated by sprinklers	Irrigate the garden bed immediately after application at a rate of 1mcube for each 100m <sup>2</sup> (10mm water)	-
Hedgerows and shrubs (Roses, Hybiscus)	Whitefly, Aphids, Thrips, Mealy bug	<b>By soil drench:</b> Use 1cc per 50cm plant height		-
Ornamental trees	Whitefly, Aphids, Thrips, Mealy bug, Jassids	<b>By soil drench:</b> Use 1cc per 1cm stem diameter of the tree		-
Ornamental plants in flowerpots and window boxes	Whitefly, Aphids, Thrips, Mealy bug	<b>By soil drench:</b> <b>Pot diameter - rate</b> Ø12cm - 0.1cc Ø15cm - 0.2cc Ø20cm - 0.5cc Ø25cm - 0.7cc Ø35cm - 1.8cc Ø40cm - 2.5cc <b>Box length - rate</b> 40cm - 1cc 60cm - 1.5cc 80cm - 2cc 100 cm - 2.5cc	Dilute the required quantity of Confidor with irrigation water into a watering can or bucket and apply. Material should be absorbed by the roots, therefore one should take care that there is no run-off during application.	
Strawberry	Aphids	<b>By soil drench:</b> Use 0.5cc Confidor per 10 plants.	Repeat treatment only when insect infestation is renewing.	14 days
Tomato	Whitefly, Aphids	<b>By soil drench:</b> 1cc Confidor per 10 plants		3 days
Pepper	Whitefly, Aphids			3 days

Crop	Pest	Dosage	Comments and application methods	Last treatment before picking
Vine	Jassids, Thrips, Mealy bugs	<b>By soil drench:</b> Use 1.5cc Confidor per vine	Repeat treatment only when insect infestation is renewing.	30 days
Citrus	Citrus leaf miner, Aphids, scales, Mealy bugs, Florida wax scales	<b>By soil drench:</b> 1-4cc Confidor for young trees 5-10cc Confidor for mature trees according to size		30 days
Apple	Aphids, Jassids, Eriosoma lanigerum (wooly aphid)	<b>By soil drench:</b> 1-4cc Confidor for young tree 5-10cc Confidor for mature tree according to size		30 days
Pecan	Yellow Pecan aphid	<b>By soil drench:</b> 5-10cc Confidor for young tree 10-20cc Confidor for mature tree according to size		40 days
Date	Honey dew jassid	Drench application 5 cc/tree Confidor		14 days
	Red palm weevil	Drench application 5 cc/tree Confidor - once a month during 3 sequential months		30 days
Canary Island date palm	Red palm weevil	Spray to the palm branch area. 0.12% Spray volume 15 Liter/tree	-	

**Remarks to Table:** Do not apply Confidor more than twice a year. Minimal intervals between applications: 2 months.

Scarabs: It is recommended to combine with summer's treatment of Maxguard.

**Days before picking fruits:** Strawberries – 14 days. Tomatoes – 3 days. Peppers – 3 days. Grapes – 3 days. Citrus – 30 days. Apples – 30 days. Pecan – 40 days. Dates – 14 days

**Disposal of pesticide wastes:** Make sure that pesticide wastes doesn't reach water sources (lake, stream, spring or ornamental pool). Residues of product in the sprayer can be a health hazard.

### Personal Protection after application:

Wash carefully with soap and change into clean clothes. Do not use again soiled working clothes, unless they are washed separately.

**Re-entry to lawn:** Lawn can be used after drying of lawn from irrigation system.

### First Aid

If material accidentally comes into contact with **skin** or **eyes** rinse them thoroughly with a large amount of water. In case the irritation does not stop – consult a physician. In case of **swallowing** – call a physician immediately and show him this label.

**Storage Instructions:** Keep material in locked cool and shaded area, out of reach of children and away from food or feed. Close the bottle with its cover after each use

**Spillage of material:** Pour sand or any other absorbent material.

Collect the sand and throw away in an approved waste disposal area for dangerous materials.

**Disposal of Packaging:** Rinse the empty bottle carefully, at least 3 times, and use the dilution as mentioned above. Afterwards, throw away the rinsed packing into the garbage bin.

**Information for the Physician:** The Center for Information on Poisoning, Rambam Hospital Haifa, Tel: 04-7771900.

**Conditions of Sale:** We are responsible for the compatibility of the product according to the chemical specification on the label of the container and compatibility of the declared uses as written in the label and only when the product is used according to the instructions under normal usage conditions.

Our responsibility, as stated above, does not cover instances of use of this product in a way which are contrary to the instructions written in the label, or under unusual conditions of usage or under conditions which could not have been foreseen by us. Under such conditions, the responsibility will fall completely upon the buyer of the product and on the person using it only. Any other responsibility, either directly or indirectly, is not undertaken by us.

**Produced by:** Liad Agro Ltd  
**Registration Holder:** Lidorr Elements Ltd  
**Distributed by:** Danor Ron Ltd. Tel: 1-700-700-940  
email: danorg@danorron.co.il



**מכיל: imidacloprid 350 גרם לליטר**  
**מגן על הדשא מפגיעת דרני זבליות וערצבים. כמו כן מגן על עצים, צמחי נוי ופרחים בגינה מפני פגיעת חרקים כעש המנהרות, כנימת עש הטבק, כנימות מגן, כנימת הפקאן הצהובה, תריפסים וציקדות.**  
**קרא את התווית בעיון לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה**  
**לא לשימוש ביתי, מותר בשימוש בגינה**

**للإستعمال بالجنانن والبيوت**

מספר רשיון הגה"צ: 1379/הצ/95  
 תכולה: 10 סמ"ק (ל-100 מ"ר דשא) 15 סמ"ק (ל-150 מ"ר דשא)

**טבלת היישום**

הגידול	מזיק	מינון	הערות ושיטות היישום	טפול אחרון לפני קטיף
דשא	דרני זבליות הדשא: Pentadon sp., Oryctes sp., (Phyloperla sp. ערצבים)	ריסוס 10 סמ"ק קונפידור ל-100 מ"ר דשא	יש להשקות 1 מ"ק מים לכל 100 מ"ר מייד לאחר היישום.	-
צמחי נוי ופרחים המשמשים ליישום קרקע: חרצית, נרברה, רוביניה, לימוניום יפני, סולידסטרו, סולידגו, חלבלוב הדור, לזיאנטוס, גיפסינת ואגרטום	כנימת עש הטבק, כנימות עלה, תריפס הטבק, ציקדות	ריסוס 10 סמ"ק קונפידור ל-100 מ"ר על כל השטח.	יש להשקות 1 מ"ק מים לכל 100 מ"ר מייד לאחר היישום	-
גדר חיה ושיחים (ורדים, היביסקוס):	כנימת עש הטבק, כנימות עלה, תריפס הטבק, כנימה קמחית	הגמעה 1 סמ"ק קונפידור לכל 1/2 מטר גובה צמח.	-	-
עצי נוי	כנימת עש הטבק, תריפס הטבק, ציקדות, תריפס, כנימה קמחית	הגמעה 1 סמ"ק קונפידור לכל 1 ס"מ קוטר עץ	-	-
צמחי נוי בעציצים ואדניות	כנימת עש הטבק, כנימות עלה, תריפס הטבק, כנימה קמחית	הגמעה לעציץ קוטר 12 - 0.1 סמ"ק לעציץ קוטר 15 - 0.2 סמ"ק לעציץ קוטר 20 - 0.5 סמ"ק לעציץ קוטר 25 - 0.7 סמ"ק לעציץ קוטר 35 - 1.8 סמ"ק לעציץ קוטר 40 - 2.5 סמ"ק לאדנית 40 - 1.0 סמ"ק לאדנית 60 - 1.5 סמ"ק לאדנית 80 - 2.0 סמ"ק לאדנית 100 - 2.5 סמ"ק	יש לדלל את כמות הקונפידור הדרושה במי ההשקיה במשפך או דלי וליישם. החומר צריך להיקלט ע"י השורשים לכן יש לדאוג שלא יהיה נגר בזמן היישום.	-

**דרגת רעילות: III (מסוכן לבריאות)**  
**מספר או"ם: 3082**



**כללי**  
**קונפידור** הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורוניקוטילי, מיועד להדברת מזיקים בדשא, בצמחי נוי, בפרחים ובעצי פרי. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגן. **הקונפידור** נקלט בשורשים ומועבר דרך צינורות ההובלה של הצמח אל כל חלקיו. פעולה זו גורמת לקטיה מהירה של המזיקים.

**הוראות שימוש:**  
**אזהרות: מזיק בכלינה. עלול לגרום למק בחשיפה ממושכת וחוזרת.**

- אמצעי זהירות ומניין:**
- יש להמנע ממוגד התכשיר עם חלקי הגוף הגלויים, הפה והעיניים.
  - אין לאכול או לעשן בזמן הטיפול.
  - בזמן היישום, מומלץ ללבוש בגדי עבודה ולהשתמש בכפפות ליישום ובמשקפי מגן.
  - בעת ריסוס יש להקפיד שמשב רוח ישא את חומר ההדברה מהמפעיל והלאה.
  - רצוי לרסס מוקדם בבקר או לפנות ערב כשאין רוח וכשאין אנשים ובעלי חיים בסביבה.
  - לאחר יישום בדשא - אין לעלות על הדשא אלא לאחר שיבש מההשקיה המפעילה.

**טכנות לטיפול:**  
 רעיל לזבובים (כאשר מיושם בריסוס בלבד). התכשיר מזיק ליצורים החיים בסביבה מימית. יש להימנע מפיזור התכשיר קרוב למקורות מים (אגם, נחל, מעיין או בריכת נוי).

**הכנת קונפידור לשימוש:**  
**הכנת תרסיס לטיפול בדשא ובשטחים עם צמחי כיסוי:**

- קובעים את כמות המים למהול **הקונפידור** על ידי ריסוס ניסוי של כל שטח המדושה במים בלבד. כמות המים שנצרכה בריסוס הניסוי היא הכמות בה יש למהול את כמות הקונפידור המומלצת. במידה וכמות המים הדרושה גבוהה מנפח המרסס יש לחלק את היישום למספר ריסוסים ובהתאם לכך את הקונפידור והמים.
- מנערים היטב את בקבוק **הקונפידור** לפני שימוש.
- פותחים את מסכה הבקבוק תוך לחיצה וסיבוב כנגד כיוון השעון.
- שואבים את **הקונפידור** מהבקבוק באמצעות המזרק המצורף את הכמות הדרושה לטיפול.
- שופכים את הכמות הדרושה של **הקונפידור** לתוך המרסס.
- מוסיפים מים בכמות שנקבעה בריסוס הניסוי, תוך כדי ערבוב.

**הכנת קונפידור לטיפול בעצים ובצמחי נוי:**

- מנערים היטב את בקבוק **הקונפידור** לפני שימוש.
- פותחים את מסכה הבקבוק תוך לחיצה וסיבוב כנגד כיוון השעון.
- שואבים את כמות **הקונפידור** הדרושה לטיפול מהבקבוק באמצעות המזרק.

**אופן היישום:**

- בדשא ובשטחים עם צמחי כיסוי (המושקים במטרת או מתזים):**
- מרססים את הדשא. בזמן הריסוס יש לנער מדי פעם את המרסס.
- בעת הריסוס יש להקפיד שמשב רוח ישא את חומר ההדברה מהמפעיל והלאה.
- רצוי לרסס לפנות בקר או לפנות ערב כשאין רוח ואין אנשים או בעלי חיים בסביבה.
- משקים מייד לאחר הריסוס ב-1 מ"ק ל-100 מ"ר.

**בצמחים המושקים בטפסוף:**

- מפעילים את ההשקיה כ-1/3 מזמן ההשקיה הרגיל.
- חופרים בור קטן באזור הרטוב מתחת לטפסוף.
- שופכים באמצעות המזרק את **הקונפידור** לתוך הבור במינון המתאים ומכסים.
- ממשיכים להשקות עד להשלמת כמות ההשקיה הרגילה. החומר צריך להגיע ולהיקלט ע"י השורשים.

**בעצים שאינם מושקים:**

- חופרים מספר בורות קטנים מסביב לעץ ב-2/3 המרחק מהגבע לקו נוף העץ.
- שופכים את **הקונפידור** באמצעות המזרק לתוך הבור במינון המתאים ומכסים.
- משקים כל בור באמצעות צינור במשך מספר דקות. **הקונפידור** צריך להגיע ולהיקלט ע"י השורשים.

**בעציצים, צמחי נוי וירקות בגינה שאינם מושקים בטפסוף:**

- שופכים את הכמות הדרושה לדלי מים או משפך.
- מוסיפים מים עד יחס של 1 ליטר מים לכל 1/2 סמ"ק, תוך כדי ערבוב.
- משקים את הצמח בתמיסה ומוסיפים השקיה רגילה.

**המשך טבלת היישום:**

הגידול	מזיק	מינון	הערות ושיטות היישום	טפול אחרון לפני קטיף
תות שדה	כנימות עלה	הגמעה 1/2 סמ"ק קונפידור ל-10 צמחים	לאחר היישום, יש לחזור על הטיפול רק עם התחדשות בגיעות המזיק.	14 יום
עבכניה	כנימות עלה, כנימת עש הטבק	הגמעה 1 סמ"ק קונפידור ל-10 צמחים		3 ימים
פלפל	כנימות עלה, כנימת עש הטבק	1 סמ"ק קונפידור ל-10 צמחים		3 ימים
גפן	ציקדות, תריפס, כנימה קמחית	הגמעה 1/2 - 1 סמ"ק קונפידור לגפן		3 יום
הדרים	עש מנהרות ההדר, כנימות עלה, כנימה ממוגנת, כנימה קמחית, זוגנית פלורידית	1 - 4 סמ"ק קונפידור לעץ צעיר 5 - 10 סמ"ק קונפידור לעץ בוגר לפי גודל העץ		30 יום
תפוח	כנימות עלה, כנימות דם, ציקדות	1 - 4 סמ"ק קונפידור לעץ צעיר 5 - 10 סמ"ק קונפידור לעץ בוגר לפי גודל העץ		30 יום
פקאן	כנימת הפקאן הצהובה	10-5 סמ"ק קונפידור לעץ צעיר 10-25 סמ"ק קונפידור לעץ בוגר לפי גודל העץ		40 יום
תמר	ציקדת הדבש	הגמעה 5 סמ"ק קונפידור לעץ דקל		14 יום
	חדקנית הדקל האדומה	הגמעה 10 סמ"ק קונפידור לעץ דקל - פעם בחודש כמשך 3 חודשים		30 יום
דקל קנרי	חדקנית הדקל האדומה	זילוף לאזור הלולב 0.12% נפח תרסיס 15 ליטר/עץ		-

**הערות לטבלה:**

אין ליישם **קונפידור** יותר מפעמיים בשנה (חוץ מבדקלים). מרווח זמן מינימלי בין יישום ליישום: חודשיים.  
 ערצבים: מומלץ לשלב את הטיפול ביישום קייצי של מקסגארד.  
**ימי המתנה לפני אכילת פרי:** תות שדה: 14 יום. עבכניות: 3 ימים. פלפל: 3 ימים. ענבים: 3 יום. הדרים: 30 יום. תפוח: 30 יום. פקאן: 40 יום, תמר: 14 יום.

של ילדים). יש לסגור את האריזה היטב לאחר כל שימוש.

**טיפול בתכשיר שנשפך:** מספיקים בחול או בחומר סופג אחר. בחומר הספוג ניתן להשתמש מתחת לטפספת או לאסוף, לארוז בשקית אשפה פלסטית אטומה, לסגור היטב ולהשליך לאשפה.

**טיפול באריות ריקות:** אין להשתמש באריות שימוש חוזר. יש להכניס את האריזה הריקה לשקית אשפה פלסטית אטומה ולהשליך לפח האשפה.

**עזרה ראשונה:**  
 במקרה של גירוי ממגע קונפידור **בעור** או **בעיניים**: יש לטשוף בכמות גדולה של מים. אם הגירוי אינו פוסק, יש לפנות לרופא. במקרה של **בליעה**: יש לקרוא מיידית לרופא ולהציג בכפיו את אריזת המוצר.

**מידע לרופא:** המרכז הארצי לטיפול בהרעלות. ביה"ח רמבי"ם טל: 04-7771900