

הכנת התרסיס:
ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים. מפעילים את המערבל ושמים את כמות האנוידור הדרושה. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול.
הנחיות כלליות:
1. יש לנער היטב את הבקבוק לפני השימוש!
2. יש לבצע את הריסוס בשעות האור המוקדמות לאחר התייבשות הטל על גבי העלווה (במידה ויש).
3. אין לרסס בתנאי אקלים קיצוניים או כאשר הגידול במצב עקה או בטמפ' אוויר מקסימליות נמוכות מ-25 מ"צ.

אופן היישום:				
הגידול	הפגע	מינון	נפח התרסיס (ליטר/דונם)	מועד אחרון לטיפול
הדרים	אקרית החלודה ¹	0.02% (אך לא פחות מ-90 סמ"ק/ד')	500-200 לפי גודל עצים או בנפח עד נגירה במרסס רובים עד נגירה	14 יום
	אקרית אדומה מזרחית	0.02%		
	אקרית ארגמנית	0.03%	400-200 לפי גודל עצים או בנפח עד נגירה	28 יום
אבוקדו	אקרית האבוקדו	0.02%	עד נגירה	14 יום
תפוח	אקרית אירופית אקרית צהובה ²	0.04%		
אגס	ביצי פסילת האגס (ראה הערה 3)	0.075% 0.04% + טלסטאר	200-100 לפי גודל עצים	21 יום
	אקרית אירופית אקרית צהובה ²	0.04%		
שזיף, אפרסק, נקטרינה, משמש	אקרית צהובה ²	0.03%	עד נגירה	14 יום
	ציקדה ירוקה (דרגות צעירות בלבד)	0.04%		
שקד	אקרית צהובה ²	0.03%	עד נגירה	7 יום
	ציקדה ירוקה (דרגות צעירות בלבד)	0.04%		
גודגדן, רימון	אקרית צהובה ²	0.03%	עד נגירה	לשימוש בעץ לא נושא פרי בלבד
	ציקדה ירוקה (דרגות צעירות בלבד)	0.04%		

הערות:
1. יש לרסס בנגיעות נמוכה מ-2 אקריות במוצע לשדה זכוכית מגדלת בעלת הגדלה של פי 10 ושטח ראייה של 2.25 סמ"ר.
2. יש לרסס בנגיעות נמוכה מ-0.5 אקרית במוצע (צהובה ו/או אירופית) לעלה.
3. יש ליישם את התכשיר בדור החורפי של פסילת האגס ולשלב עם קוטל בוגרים.
שילובים בתפוח: ניתן לשלב אניידור עם: קליפסו 480 ת.ר., פלינט 50% ג.ר., ובאפידין 250 ת.מ. בהתאם להמלצות הרשומות בתווית התכשיר.
שילובים באגס: ניתן לשלב אניידור עם טלסטאר 50 ת.מ. בהתאם להמלצות הרשומות בתווית התכשיר.
כל שילוב אחר אין לבצע.

אינקדור 240 SC

מבید לענאכב וالتسيكادا

מבید לענאכב וالتسيكادا וبيوض بسيلا الآحاص في أشجار الفاكهة، الحمضيات والأبوكادو

تصنيف: IV خطر **رقم UN : غير مصنف**

يحتوي ٢٤٠ غرام بالتر Spirodiclofen

والباقي مواد إذابة وترطيب

ترخيص قسم وقاية النبات ٠٤/ون/١٧٦٦

اقرأ تعليمات الاستعمال المرفقة داخل البطاقة

للاستعمال الزراعي فقط - ليس للاستعمال البيتي

خض العبوة قبل الاستعمال:

معلومات للطبيب: مركز المعلومات في حالة التسمم ت: ٨٥٤١٩٠٠ - ٠٤

إرشادات عامة:
أ. يجب خضّ القنبنة جيّداً قبل الاستعمال!
ب. يجب تنفيذ الرشّ في ساعات الصباح المبكرة بعد جفاف الندى عن الأوراق في حال وجوده.
ج. يُمنع الرشّ في ظروف مناخية متطرّفة أو حين يكون المحصول في وضع ذبول، أو في درجة حرارة هواء قصوى تقلّ عن 25 درجة سلزيوس.
طريقة التطبيق:

المحصول	الآفة	المقادير	حجم الرشّ لتر/دونم	الموعد الأخير للرشّ قبل الجني (أيام)
الحمضيات	عناكب الصدا (1)	0.02% وليس أقل من 90 سم متر مكعب/دونم	500-200 حسب كبر الشجر أو الرش حتى السيلان	14
	العناكب الحمراء الشرقية	0.02%	ببخاخ بندقية والرش حتى السيلان	
	العنكبوت الأرجماني	0.03%	400-200 حسب كبر الأشجار أو الرشّ حتى السيلان	28
الأفوكادو	عناكب الإفوكادو	0.02%	الرش حتى السيلان	14
التفاح	العناكب الأوروبية العناكب الصفراء (2)	0.04%		
الأجاص	بيوض بسيلا الأجاص (انظر الملاحظة 3)	0.04% + 0.075 تلستار	200-100 حسب كبر الأشجار	21
	العناكب الأوروبية العناكب الصفراء (2)	0.04%		
اللوز	العناكب الصفراء (2)	0.03%	الرش حتى السيلان	7
	تسيكادا خضراء (يرقات فقط)	0.04%		
برقوق، خوخ، تكتريّنا، مشمش فقط	العناكب الصفراء (2)	0.03%	الرش حتى السيلان	14
	تسيكادا خضراء (يرقات فقط)	0.04%		
الكرز الحلو، الرمان	العناكب الصفراء (2)	0.03%	الرش حتى السيلان	يستعمل على الأشجار غير المثمرة فقط
	تسيكادا خضراء (يرقات فقط)	0.04%		

اينقُدور: مبيد حشري فعال لمكافحة العناكب والتسيكادا في أشجار الفاكهة، الحمضيات والأبوكادو

عام: إينقُدور مستحضر حشري تابع لمجموعة كيميائية جديدة يمتاز بجهاز فعالية متطور وحديث يؤدي الى تعطيل تكون الأحماض الدهنية في جسم الحشرة، له فعالية ممتازة على بيوض وحوريات العناكب (العناكب الأوروبية والعناكب الصفراء، عناكب الأبوكادو، العناكب الحمراء الشرقية) وكذلك للعناكب الفضية - الصائدية للحمضيات.

للمستحضر فعالية على إناث العناكب البالغة حيث يمنع الاناث من وضع البيوض مما يؤدي الى قتلها. إينقُدور ليس له تأثير على ذكور العناكب. ومن أجل منع ترسّخ العناكب في البيارة والبستان، يجب رش المستحضر فقط عندما تكون الإصابة منخفضة جداً (انظر التعليمات في الجدول). كما يُببّد المستحضر درجات التسيكادا الخضراء ويمنع بذلك ترسّخ الحشرة في البستان.

تعليمات الاستعمال:

تحذيرات: قد تؤدي ملامسة المستحضر الى حساسية بالجلد.

المادة تؤدي لتورمات سرطانية لحيوانات المختبر

أخطار للبيئة: المستحضر غير ضار بالنحل البالغ لكنه قد يؤثر على تطور اليرقات.

وسائل الحذر: يجب استعماله بموجب قواعد الحذر المتبعة عند استعمال المبيدات.

استعمل لباس كامل لكل الجسم، قفازات، كمامة، نظارات واقية أثناء الرش واحذر من

استنشاق وابتلاع المستحضر ومن ملامسته المباشرة لأعضاء الجسم، ممنوع الأكل، الشرب

والتدخين أثناء الاستعمال.