



אטריביוט קומבי 20% ג.ה.

קוטל עשבים דגניים ורחבי עלים לחיטה



פרופיל התכשיר:

- **שם מסחרי:** אטריביוט קומבי
- **מכיל:** Propoxycarbazone-sodium 6.75%
Mesosulfuron-Methyl 4.5%
Mefenpyr-Diethyl (safener) 9%
- **קב' כימית:** מעכב ALS
- **גידולים עוקבים:** חיטה, אבטיח מללי, כותנה, תירס, חימצה, תלתן ותפוז"א (בהתאם למגבלות שבתווית).



השוואה כימית בין האולימפוס לאטריביוט קומבי:

השוואת מינון ה- Propoxycarbazone-sodium לדונם
בין האולימפוס לאטריביוט קומבי

- אולימפוס: 4.55 גרם לדונם
- אטריביוט קומבי: 1.01 גרם לדונם



השוואת מינון ה- Propoxycarbazone-sodium לדונם
באטריביוט קומבי עומדת על 22.2% לעומת האולימפוס

עשבים מודברים:

- **דגניים:** בן חיטה אריכה*, מיני חפורית (מוזרה, מצויה, קטנה והפקעים), שיבולת שועל, ברומית הגגות ושעורת התבור*
- **רחבי עלים:** חלמית, חרדל השדה ומיני מצליבים אחרים

* הדברה חלקית תלוית גיל העשב.



הוראות יישום התכשיר:

- **זנים מותרים בתווית:** גליל, גדרה, רם, זהיר, יובל, אריאל ובית השיטה (באזורים עם רמת משקעים מעל 300 מ"מ)
- **מינון:** 15 גר"/ד'
- **מועד הטיפול:** לאחר הצצת החיטה, 2 – 6 עלים
- **שילובים:** דרבי 4 סמ"ק/ד'
- **משטח לא יוני (חובה):** שטח 90, סיבה, DX
- אין לשלב עם דופלזון עקב הפרעה בהדברת דגניים.



אין לרסס בשדות חיטה שעברו עקת יובש (או כל עקה אחרת) ומומלץ לרסס לפני מערכת גשם משמעותית.

הוראות גידולים עוקבים:

איזור	גידול	זמן זריעה/שתילה לאחר ישום אטריביוט קומבי	סך משקעים לאחר ריסוס (ממועד הריסוס ועד זריעת גידול עוקב)
מרכז וצפון הארץ	אבטיח מללי, כותנה (אקלפי, גולית)	3.5 חודשים	מעל 400 מ"מ
	חימצה וחיטה	שנה	
	תירס חמצץ (סיימון, ויאני, W-99) תירס מתוק (רויאלטי, אמפייר, אליסה) תירס פופקורן (618)	3.5 חודשים	
דרום הארץ: עד קו סעד במערב ודורות בצפון מזרח	אבטיח מללי	שנה	לפחות 250-300 מ"מ או יותר
	חימצה		
	תלתן		
	תפוז"א		
	חיטה		

אין לזרוע גידולים עוקבים אחרים במחזור אלא משחלפו 20 חודשים ממועד הריסוס וירדו לפחות 400 מ"מ גשם בחודשי החורף שלאחר מועד הריסוס ועד לזריעת הגידול המתוכנן במחזור הפלחה. בחלוף הזמן הנקוב, חובה לעבד את השדה בחריש או בדיסק מעמיק בטרם יזרע הגידול העוקב במחזור. (לברורים ולקבלת ייעוץ מקצועי, יש לפנות אל משרדי חברת לידור).

בטיחות הטיפול מבוא חורן 2009:

מצב החיטה 8 יום לאחר טיפול אטריביוט 15 משולב עם ברומינל ושטח 90



בטיחות הטיפול מבוא חורון 2009:

מצב החיטה 30 יום לאחר טיפול אטריביוט 15 משולב עם ברומינל ושטח 90 (ההצהבה נעלמה)



ניסוי: גד"ש דגנים 2007-2008



ניסוי: גד"ש דגנים 2007-2008



יעילות הדברת שעורת תבור 30 יום לאחר ריסוס


מושב קידרון | 21.12.09

הדברת השעורה, רצוי
שתבצע על צמחים
צעירים בלבד
(צמחי שעורה מפותחים
שרדו את הטיפול).




ניסוי: כפר ורבורג 2008

היקש



ניסוי: כפר ורבורג 2008

אולימפוס 6.5 + דופלזן 120 + תפ



ניסוי: כפר ורבורג 2008

אטריביוט קומבי 15 + תפ



ניסוי: כפר ורבורג 2008

טיפול משקי: אולימפוס + אורורה טורבו + תפ

היקשים



תוצאות ניסוי הדברת נירית הקמה צבר קמ"ה

2011-2012



10 ימים
לאחר ריסוס

תוצאות ניסוי הדברת נירית הקמה צבר קמ"ה

2011-2012

היקש



אטריביוט 15 + שטח 90*



בקטעים בהם התפתחות החיטה עוכבה (מסיבות קרקע)
צמחי נירית הקמה התאוששו ופרחו מעל החיטה.

תוצאות ניסוי הדברת נירית הקמה צבר קמ"ה

2011-2012



יבול (ק"ג/ד')	נירית הקמה* % שיבוש (3.6.12)	בריאות החיטה (1.1.12)	טיפול
370	11.3 ב	86.3 ב*	אטריביוט קומבי 15 + שטח 90
436	0 ב	80.0 ג	אטריביוט קומבי 15 + אקספרס 1.5 + שטח 90
414	2.5 ב	78.5 גד	אטריביוט קומבי 30 + אקספרס 3 + שטח 90
470	0 ב	81.7 ג	אטריביוט קומבי 15 + ברומינל 100 + שטח 90
407	0 ב	80.0 ג	אטריביוט קומבי 15 + אקספרס 1.5 + ברומינל 100 + שטח 90
460	0.7 ב	70.0 ו	אטריביוט קומבי 30 + אקספרס 3 + ברומינל 200 + שטח 90
408	0 ב	75.0 דה	אטריביוט קומבי 15 + דרבי 4 + ברומינל 100 + שטח 90
425	0 ב	71.7 הו	אטריביוט קומבי 30 + דרבי 8 + ברומינל 200 + שטח 90
337	47.5 א	100 א	ביקורת

אטריביוט קומבי כפתרון להדברת דגניים עמידים למעכבי Accase בחיטה

חפורית מוזרה עמידה למעכבי Accase (לאחר טיפול משקי באקסיאל)

שדה יואב | 2012-2013



השוואת טיפול אטריביוט קומבי לאקסיל

צבר קמ"ה | 2009-2010

אטריביוט קומבי



אקסיל



חפורית
מצויה
ומוזרה

תוצאות טיפול אטריביוט קומבי + ברומינל

מבוא ביתר | 2009-2010



תוצאות טיפול אטריביוט קומבי + ברומינל

עד הלום (חצור) | 2009-2010



סיכום



- אטריביוט קומבי הינו קוטל עשבים דגניים ומעט ר"ע חדש לחיטה.
- אטריביוט קומבי מדביר ביעילות שיבולת שועל, מיני חפורית, זנב שועל וברומית הגגות.
- אטריביוט קומבי יעיל להדברת זון ביישום של עד גיל 3 עלים.
- אטריביוט קומבי מפחית באופן משמעותי את השיבוש בשעורה ובן חיטה בהתאם לגיל העשב בזמן הריסוס.
- לשם הרחבת טווח פעילות ההדברה, ניתן לשלב אטריביוט קומבי עם קלסיקו או דרבי.
- אטריביוט קומבי גורם להצהבת החיטה, תופעה הנעלמת בהמשך העונה ואינה פוגעת ביבול.
- על מנת לשפר את יעילות ההדברה חובה להוסיף משטח לא יוני.

זני תירס אשר נזרעו על קרב חיטה שטופל באטריביוט קומבי והתפתחו ללא פגיעה

מ"מ גשם לאחר ריסוס האטריביוט	משק	זנים
300	סער	פופקורן, סיימון, רויאלטי, אליסה
319	שניר	אמפייר
191	חולתה	רויאלטי וויאני
294	גד"ש השדות	W-99
360	קב' יבנה	אורפסה
262	חצור	אורפסה 32w86



תודה



972-3-7606222



972-3-7606226



www.lidorr.com

