



Luna[®]
SENSATION[®] SC
Suspension concentrate
לונה סנסיישן לונה סנסיישן

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכיל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית: עם גמר הטפול, יש לרחוץ היטב את הגוף בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

כניסה מחדש לשטח: אפשר להיכנס לשטח/גידול המטופל רק לאחר 12 שעות ממועד יישום התכשיר ולאחר התיישבות מוחלטת של התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסנה: לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: את האריזות הריקות לשטוף 3 פעמים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס במיכל המרסס. אח"כ יש למעוך אותן ולהשליך לפח אשפה. בכל מקרה אין לעשות באריזות הריקות שימוש חוזר.

עזרה ראשונה: במקרה של **בליעה**, הוצא את הנפגע לאוויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא, והצג בפניו תווית זו. במקרה של **זיהום בעיניים**, יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של **זיהום העור**, רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, ב"ח רמב"ם טלפון מס': 04-7771900

תנאי מכירה:

אנו ארוחאים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים.

אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו.

Bayer

IL872744462A

הוראות השימוש:

אזהרות: מזיק בבליעה, עלול לגרום לתגובה אלרגית.

אמצעי זהירות ומיגון:

בזמן העבודה עם התכשיר לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער.

השתמש בכפפות ניטריל לפי התקן (EN-374/3), משקפי מגן עם אטימה מהצד לפי תקן (EN-166) ומסכת חצי פנים לפי תקן (EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3. יש להימנע מבליעה ושאיפת אדי התכשיר. נמנע מגע עם העור, העיניים והבגדים.

אין להימצא בענן התרסיס, אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

סכנות לסביבה: רעיל מאוד ליצורים השוכנים בסביבה מימית. עלול לגרום להשפעות שליליות לטווח ארוך בסביבה מימית. אין לרססו בקרבת מקווי מים או חנלים. יש להיזהר לבל יישפכו שאריות מן המרסס למקורות מים. יש לפנות את החומר והמכלים בהתאם להוראות פינוי פסולת מוסכנת. אסור ליישם את החומר במרחק של 100 מטר ממבנים. אינו רעיל לדבורים.

הכנת התרסיס: ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים. מפעילים את המערבל ושמים את כמות הלונה סנסיישן הדרוש. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול.

אופן היישום:

הגידול	המחלה	המיגון (סמ"ק/דונם %)	נפח תרסיס (ל'/'ד')	מועדי יישום	הערות	ימי המתנה
הדובדבן*	כתמת (צ'רקוספור), כתמי עלים קטנים (דובדבן/בלמילירה)	0.035%	100-200	טיפול שבועיים מקטיף שני שבועות לפני מקטיף	יש לטפל בהתאם לעוצמת הנגיעות.	7
	עובש אפור (בוטריטיס), ריקבון חום (מוניליה)	0.07%			יש לדאוג לכיסוי טוב של כל הגוף בעת הריסוס.	
חצי-ל**	קמחוניות	40	30-80			7

הערה: *דובדבן אין לטפל יותר מ 2 יישומים במיגון מקסימלי של 0.07% בעונה. ****בצילי אין לטפל יותר מריסוס בודד בעונה.**

שילובים: בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם חומרים אחרים (כולל חומרי הונה).



Luna[®]
SENSATION[®] SC
Suspension concentrate
לונה סנסיישן לונה סנסיישן



1 ליטר

קוטל פטריות להדברת מחלות בדובדבן וחציל.

מכיל: 250 גרם לליטר Flupyram
250 גרם לליטר Trifloxystrobin

כללי: לונה סנסיישן הינו תכשיר המשלב 2 חומרים פעילים מקבוצות כימיות שונות שהם בעלי מנגנוני פעולה שונים. החומר הפעיל הראשון הוא פלואפירם, קוטל פטריות בעל ספקטרום רחב ויכולת חדירה טובה ליישום בריסוס עלוות. החומר הפעיל השני הוא טריפלוקסיסטרובין. זהו חומר קוטל פטריות מקבוצת הסטרובילורונים. חומר זה נספח במהירות לשכבת השעווה שבקוטיקולה ומשם חודר אל רקמת העלה באופן טרנסלמינרי. שני החומרים הפעילים פועלים במיטוכונדריות התאים על שלבים שונים של תהליך הנשימה התאית. פלואפירם משבש העברת אלקטרונים בקומפלקס II ואילו טריפלוקסיסטרובין מעכב העברת אלקטרונים בקומפלקס III. על כן, מנגנוני הפעולה שלהם שונים ומשלמים זה את זה.

סיווג: III (מסוכן לבריאות)
"קרא בעיני את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה"
לא לשימוש ביתי-לשימוש חקלאי ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

רשיון האגף להגנת הצומח מס' 4591/הצ/2021

מיוצר ע"י BAYER AG, FRANCE

משוק ע"י:

לידור אלמנטס בע"מ
רח' הנביאים, ת.ד. 116
רמת השרון 4710002
טלפון מס' 03-7606222



תאריך ערוך תחומי 04.04.2022

LIDORR ELEMENTS LTD.
Haneviim Str. P.O.B.116
4710002 Ramat Hasharon
TEL. 03-7606222

IL87274462 - SOMA CREATION