

# דיסארם 480 תרכיז רחף

## Disarm® 480 SC

### קוטל פטריות להדברת מחלות בגידולי פרחים

1 Lit

מכיל: 480 גרם בליטר Fluoxastrobin  
היתר: חומרי דילול והרטבה.

סיווג: IV (מסוכן) מס' או"ם: לא מסווג

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי  
للإستعمال الزراعي فقط وليس للإستعمال البيتي

קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על יישום אך ורק על פיה

רשיון האגף להגנת הצומח: 4147/הצ/14

BATCH NUMBER AND PRODUCTION DATE : SEE ON THE BOTTLE  
EXPIRY DATE : PRODUCTION DATE + 2 YEARS

תאריך עדכון התווית: 02/2017

**הערות:** יעילות רבה יותר תושג בריסוס מניעה מאשר בריסוסים על גבעות קיימות. יש לרסס כדי כיסוי מלא של העלווה והפרי לשם השגת הדברה טובה. למרווחי הריסוס יש חשיבות גדולה בהצלחת ההדברה ולכן אין לעבור את מרווח הזמן הקבוע בטבלה.

#### בגמר השימוש:

**ניקוי ציוד הריסוס לאחר השימוש:** יש לשטוף את מיכל המרסס במים ודטרגנט. מלא מעט מים ודטרגנט במיכל המרסס והפעל את המשאבה כדי שמי הדטרגנט יעברו בכל המערכת. יש להקפיד שמי השטיפה לא יזרמו לשדות מעובדים, למקורות מים או לבריכות דגים. לא ירדן אדם ולא יגרם לכך שירדן תכשירים או שאריותיהם ממתקן הריסוס, ממכלי אסוף או ממתקן אחר אל מקור מים בין במשירין ובין בעקפין. עלה נפח מתקן הריסוס כאמור על 150 ליטר, לא יעשו ריקון ושטיפה כאמור אלא במתקן שטיפה. **סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכלי אסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיחור, איזוי ופינוי לאחר הפסולת הרעילה ברמת חובב. **הגנה אישית:** עם גמר הספול, יש לרוחץ היטב את הגוף בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לבכס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

**כניסה מחדש לשטח:** אפשר להיכנס לשטח/גידול המטופל לאחר 12 שעות מריסוס התכשיר. בכניסה אל השטח ביום הריסוס יש להגן על הרגליים, פלג גוף עליון והזרועות עם ביגוד סטנדרטי לשימוש עם תכשירים להגנת הצומח.

**אחסנה:** לאחסן את התכשיר במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.

**תכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

**טיפול באריות ריקות:** את האריות הריקות לשטוף 3 פעמים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסים במיכל המרסס. אח"כ יש למעוך אותן ולהשליכן לפח אשפה. בכל מקרה אין לעשות באריות הריקות שימוש חוזר.

**עזרה ראשונה:** במקרה של בליעה, הוצא את הנפגע לאוויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא, והצג בפניו תווית זו. במקרה של זיהום בעיניים, יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.

**מידע לרופא:** המרכז הארצי למידע בהרעלות, ב"ח רמב"ם טלפון מס': 04-7771900.

**תנאי מכירה:** אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על ידי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריה, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנגדית את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו.

**כללי:** דיסארם הינו קוטל פטריות מקבוצת הסטרובילורנים. התכשיר הינו סיסטמי ונקלט על ידי העלווה ומועבר דרך מערכות ההובלה של הצמח לאיברים נוספים.

#### הוראות השימוש:

**אזהרות:** עלול לגרום לגירוי קל בעור או לתגובות אלרגיות לאנשים רגישים כאשר בא במגע עם העור החשוף.

**אמצעי זהירות:** יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להשתמש בסרבל מלא, נעליים וגרביים, כפפות גומי, בעת הטיפול בתכשיר המרוכז, יש להשתמש במשקפי מגן. יש להימנע מבליעת התכשיר ושיאיתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר. מנע מגע עם עור חשוף, עיניים וביגוד.

**סכנות לסביבה:** מסוכן לאויבים טבעיים. רעיל מאוד ליצורים השוכנים בסביבה מימית. עלול לגרום להשפעות שליליות לטווח ארוך בסביבה מימית.

אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:  
א. מגבולת הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.

ב. מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים.  
ג. מחיפה-קריית עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.  
לא נכללות באזור זה חלקות בהן: ישעור חרסית הקרקע הוא 15% ויותר או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.

#### הכנת התרסים:

ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים. מפעילים את המערבל ושמים את כמות הדיסארם הדרושה. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול.

#### אופן היישום:

| הגידול                                     | המחלה | הריכוז ב-<br>ריסוס מ-1000<br>לדונם ומעלה | המינון<br>(סמ"ק/דונם)<br>ריסוס<br>בנפח קטן<br>(עד 100 ליטר<br>לדונם) | מרווח בין<br>הריסוסים<br>(ימים) | מועד אחרון<br>לריסוס<br>(ימים לפני<br>אסוף או<br>קטיף) | הערות                                     |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| *מיני פרחים: סולדיג, לימוניום, ורד, גיבסית | קימוח | 0.025%                                   | 25                                                                   | 7-10                            | -                                                      | יש לדאוג לכיסוי טוב של כל הנפח בעת הריסוס |

\* רשימת זנים מותרים לריסוס:

סולדיג - גולד גלורי, לימוניום - אגנטה, בלטלד, מיי בלו, ורד - גולד גיט, לובל רד, אבנלד.  
ליזיאנטוס - רוזיטה לבן, רוזיטה כחול, גיבסנית - פרפקטה.

**שילובים:** ניתן לשלב עם רידומיל גולד גולד  
אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים.



Arysta  
LifeScience



לידור אלמנטס בע"מ, ת.ד. 116 רמת השרון 4710002. טל: 03-7606222

